

الطبعة التجريبية ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

الطف التاسع

الفصل الدراسي الأوّل

الطبعة التجريبية ١٤٤٢هـ - ١٠٦٠م



الكيمياء

كتاب الطالب



الفصل الدراسي الأول

الطبعة التجريبية ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م

CAMBRIDGEUNIVERSITY PRESS



مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزءًا من الجامعة. وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خلال نشر المعرفة، سعيًا وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع للاستثناء التشريعي المسموح به قانونًا ولأحكام التراخيص ذات الصلة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على الإذن المكتوب من مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان.

الطبعة التجريبية ٢٠٢٠ م، طُبعت في سلطنة عُمان

هذه نسخة تمَّت مواءمتها من كتاب الطالب - العلوم للصف التاسع - من سلسلة كامبريدج للعلوم المتكاملة IGCSE للمؤلفين ماري جونز، ريتشارد هاروود، إيان لودج، ودايفيد سانغ.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناءً على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة جامعة كامبريدج رقم ٤٠ / ٢٠٢٠ .


تمت مواءمة الكتاب بموجب القرار الوزاري رقم ٣٠٢ / ٢٠١٩ واللجان المنبثقة عنه



جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم

ولا يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كاملاً أو مجزّاً أو ترجمته أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من الأشكال إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة الاقتباس القصير يجب ذكر المصدر.





حضرة صاحب الجلالة

المغفور لـه السلطان قابوس بن سعيد -طيّب اللّه ثراه-



سلطنة عُمان







النَّشيدُ الْوَطَنِيُّ



جَـ لالَـةُ السُّلطان

يا رَبّنا احْفَظْ لنا وَالشَّعْبَ فِي الأَوْطَانِ بِالْعِزِّ والأَمَان وَلْيَ لُمْ مِ وَيَّالًا عِلْهِ اللَّهُ مُ مَوِّيًّا عِلْمُ مَ جَّدًا

بِالنُّفوس يُفْتَدى

أُوْفِياءُ مِنْ كِرام الْعَرَبِ وَامْلَئِي الْكُوْنَ الضِّياء

يا عُمانُ نَحْنُ مِنْ عَهْدِ النَّبِي فارْتَقى هامَ السَّماء

وَاسْعَدي وَانْعَمى بالرَّ خاء



تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، سيّدنا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجالاتها المختلفة كافة؛ لتُلبّي مُتطلّبات المجتمع الحالية، وتطلُّعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المُستجدّات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤدّي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجالات التنمية الشاملة للسلطنة.

وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوِّنًا أساسيًا من مُكوِّنات المنظومة التعليمية، بمراجعة مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة؛ بدءًا من المقررات الدراسية، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتمامًا كبيرًا يتلاءم مع مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي. ومن هذا المنطلق اتَّجهت إلى الاستفادة من الخبرات الدولية؛ اتساقًا مع التطوُّر المُتسارع في هذا المجال، من خلال تبني مشروع السلاسل العالمية في تدريس هاتين المادّتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصّي والاستتتاج لدى الطلاب، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافُسية في المسابقات العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، جاء مُحقِّقًا لأهداف التعليم في السلطنة، وموائمًا للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمَّنه من أنشطة وصور ورسومات. وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلُّم الطالب، بالإضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

مُتمنية لأبنائنا الطلاب النجاح، ولزملائنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مُخلِصة، لتحقيق أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق د. مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم

المحتويات

ΛΙ		ىھە
xii	تستخدم هذا الكتاب	کیف
	دة الأولى طبيعة المادّة	الود
10	حالات المادّة	1-1
Y7	فصل المواد وتنقيتها	Y-1
	عدة الثانية التركيب الذري	الود
٣٩	الذرّات والجُزيئات	1-7
٤٢	تركيب الذرّة	7-7
٤٧	ترتيب الإلكترونات في الذرّات	٣-٢
	دة الثالثة الجدول الدوري	الود
٥٢	الجدول الدوري للعناصر: تصنيف العناصر	1-7
٥٨	دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري	۲-۲
	دة الرابعة الروابط الكيميائية	الود
٦٢	الروابط الكيميائية وأهميتها	1-5
٧١	الصيغ الكيميائية	۲-5
YV	البِلُّورات	٣-٤
	دة الخامسة معدّل سرعة التفاعل وتغيّرات الطاقة	الود
۸۲	معدّل سرعة التفاعل الكيميائي	1-0
۸٥	العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل	۲-0
90	تغيُّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية	٣-٥
1.4	طلحات علمية	مصد
١٠٤	ول الدوري	لجد

المقدمة

سوف تتعلَّم من خلال هذا المُقرَّر الكثير من الحقائق والمعلومات، كما ستكتسب مهارة التفكير مثل العُلماء. وقد تمَّت مواءمة كتاب الطالب - الكيمياء للصف التاسع - وفق سلسلة كامبريدج للعلوم المُتكامِلة IGCSE.

تتضمَّن وحدات كتاب الطالب البنود الآتية:

الأسئلة

تتضمَّن كل وحدة مجموعات مُتعدِّدة من الأسئلة تأتي ضمن سياق فقراتها لتعزيز الفهم، وبعضها يحتاج إلى إجابات قصيرة. كما ترد في نهاية الوحدة أسئلة تُهيِّئك لخوض الاختبارات.

الأنشطة

تحتوى كل وحدة على أنشطة مُتنوّعة تهدف إلى مُساعدتك على تطوير مهاراتك العملية.

مُلخَّص

وهو قائمة قصيرة تأتي في نهاية كل وحدة، وتحتوي على النقاط الرئيسية التي تمَّت تغطيتها في الوحدة. وسوف تحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل عن هذه النقاط من خلال الرجوع إلى موضوعات الوحدة. من المفيد أيضًا استخدام كتاب النشاط، الذي يُزوِّدك بمجموعة من التمارين وأوراق العمل، تُساعدك على توظيف المعرفة التي اكتسبتها في تطوير مهاراتك في التعامل مع المعلومات وحل المشكلات، وكذلك صقل بعض مهاراتك العملية.

كيف تستخدم هذا الكتاب

تتضمَّن كل وحدة مجموعة من الأقسام تُحدِّد الموضوعات الرئيسية التي تتناولها، وتساعدك على التنقُّل ______ خلالها.

الوحدة الأولى

طبيعة المادّة The Nature of Matter

تُغطّى هذه الوحدة:

- حالات المادة الثلاث وتغيُّرات الحالة
- النموذج الجسيمي الحركي وتغيُّرات المادّة
 - الانتشار
 - نقاوة المواد وأهميتها
 - فصل المواد وتنقيتها
 - الترشيح
 - التبلُّوُر
 - التقطير
 - كروماتوجرافيا الورق
 - مُعالحة المياه

مصطلحات علمية

تحتوي المُربَّعات على تعريفات واضحة للمُصطلحات العلمية الرئيسية في كل وحدة.

مصطلحات علمية

■ المادّة Matter: أي شيء له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ. وللمادّة ثلاث حالات فيزيائية هي: الصُّلبة والسائلة والغازية.

تذكر مُربَّعات تحتوي على نصائح موجَّهة إلى الطلاَّب ليتجنَّبوا المفاهيم الخاطئة الشائعة، وتقدِّم إليهم الدعم للإجابة عن الأسئلة.

تذكّر

مع أن الجُسَيمات في السائل تكون مُتقارِبة جدًا فهي تستطيع أن تتحرَّك وتتجاوز بعضها بعضًا.

ترد الأنشطة في جميع أقسام الوحدة وتوفر إرشادات وتوجيهات لإجراء استقصاءات عملية. __

نشاط ۲-۱

اكتشاف تركيب الذرة

المهارات:

• يُعزُز مهارات البحث: مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

تم اكتشاف طبيعة الجُسنيمات دون الذرية التي تكوّن الذرّات جميعها ضمن مدّة زمنية قصيرة نسبيًا من بداية القرن العشرين تقريبًا.

تحقّق من هذه الفترة الزمنية الرئيسية في تاريخ العلوم باستخدام المكتبة ومصادر الإنترنت، ثم ابتكر عرضًا تقديميًا، أو مُلصقًا يتحدّث عن الاكتشافات المُهمَّة، والعلماء المشاركين، وأهمّهم للبحث: ج.ج. طومسون، وإيرنست رذرفورد، وجيمس شادويك.

- ١ ما الذي كان لافتًا للانتباه في تركيب الذرّة المُقترَح بتجارب جایجر - مارسدن؟
- الجُسَيمات المُكتشَفة؟

يرد ملخّص في نهاية كل وحدة ويتضمَّن تلخيصًا للموضوعات الرئيسية.—

٢ ما الشيء المُتعلِّق بطبيعة النيوترون، الذي جعله آخر

ملذَّص

ما يجب أن تعرفه:

- تحدث التفاعُلات الكيميائية المختلفة عند مُعدَّلات سرعة مختلفة إلى حد بعيد، ويمكن تغيير مُعدّل سرعة تفاعُل معيّن عن طريق تغيير الظروف، بما فيها درجة الحرارة.
- تتم زيادة مُعدَّل سرعة بعض التفاعُلات باستخدام العامل
 - طاقة تنشيط التفاعل هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء هذا التفاعُل.

ترد في كل وحدة لتقييم معرفة الطلاب واستيعابهم.

أسئلة

- 1-1 لخّص الاختلافات بين حالات المادّة الثلاث من حيث ترتيب جُسيماتها وحركتها.
- ١-٧ أي الغازين ينتشر بسرعة أكبر: الأمونيا أم كلوريد الهيدروجين؟ صف باختصار تجربة تبيّن ذلك الاختلاف بطريقة عملية.
 - ١-٨ ما الغاز ذو سرعة الانتشار الأكبر بين جميع الغازات؟

تحتوى الأطر الزرقاء على معلومات مُهمّة تعزّز نقطة رئيسيّة أو تتوسَّع فيها.

تُستخدم عملية التقطير التجزيئي Fractional distillation لفصل مُكوِّنات أي محلول يحتوي على سوائل لها درجات غليان مختلفة. فالسائل ذو درجة الغليان الأدنى (الأكثر تطايُرًا) في المخلوط يتقطّر أولًا، أما السائل الذي يتم تقطيره في النهاية فهو ذو درجة غليان أعلى (الأقلُّ تطايُرًا). ويمكن تكييف عملية التقطير التجزيئي بهدف استمراريتها، وهي تُستخدم صناعيًا لفصل:

- مُكوِّنات النفط المختلفة.
- الغازات المختلفة من الهواء المسال.
- التغیُّرات التی تزید من تکرار عملیة التصادم بین جُسَیمات المواد المتفاعُلة تؤدّى إلى زيادة مُعدَّل سرعة التفاعُل.
- تتضمن جميع التفاعلات الكيميائية على تغيرات في الطاقة، وتطلق معظم التفاعلات الكيميائية طاقة حرارية نحو محيطها (تفاعلات طاردة للحرارة).
 - تمتصّ بعض التفاعلات الكيميائية الطاقة الحرارية فتكون ماصّة للحرارة.

تلي فقرة مُلخّص مجموعة مختارة من أسئلة نهاية الوحدة لمساعدة الطلاب على مراجعة الوحدة.__

أسئلة نهاية الوحدة

أكمل الجُمَل الآتية المُتعلِّقة بالجدول الدوري، مُستخدِمًا كلمات من القائمة أدناه:

اليُمنى	المجموعة	فلزّات	الإلكترونات	الجدول الدوري
تقع العناصر	ا لازدياد أعدادها الذرّية. م المجموعة مُساويًا لعدد.	ر الكيميائية مُرتَّبة وفقً نف <i>سه</i> ا، ويكون رقم	عن قائمة تضمّ كل العناصر شابهة في	عبارة الرئيسية ذات الخصائص المت
			لخارجي للذرَّة،	الموجودة في مستوى الطاقة الم
•1	لسُّفلى من الجدول الدوري	شغل الجهة اليُسرى وا	وهي ت	مُعظَم العناصر عبارة عن
		الجدول الدوري.	والعليا من	تشغل اللافلزّات الجهة

قائمة روابط المواد الإثرائية لمادّة الكيمياء			
رقم الترميز	QR Code	الرابط	النوع
55998871		https://home.moe.gov.om/Teachers	المصطلحات العلمية
55998894		https://home.moe.gov.om/Staff	أسئلة اختيار من متعدِّد
55998905		https://home.moe.gov.om/Company	الأنشطة الإثرائية



الوحدة الأولى

طبيعة المادّة

The Nature of Matter

تُغطّى هذه الوحدة:

- حالات المادة الثلاث وتغيُّرات الحالة
- النموذج الجسيمي الحركي وتغيُّرات المادّة
 - الانتشار
 - نقاوة المواد وأهمّيتها
 - فصل المواد وتنقيتها
 - الترشيح
 - التبلُوُر
 - التقطير
 - كروماتوجرافيا الورق
 - مُعالجة المياه

١-١ حالات المادّة

المادة هي المُصطلَح المُستخدَم لوصف كل الأشياء التي تُشكِّل الكون. تتكوَّن المادة من جُسيمات، ولها أنواع مختلفة. وبصورة عامَّة، تمتلك جميع المواد خاصّيتين مشتركتين هما: أنها تشغل حيّزًا (أي لها حجم)، ولها كُتلة.

والكيمياء هي العلم الذي يهتمّ بدراسة سلوك المادّة، وكيفية تغيُّرها من نوع إلى آخر. وإذا درسنا أيّ مادَّة كيميائيَّة، نجد أنها يمكن أن تتخذ ثلاثة أشكال مختلفة (حالات فيزيائية فيزيائية الفيزيائية الفيزيائية.

وتلك الحالات الثلاث للمادة States of matter، هي: الصُّلبة Solid والسائلة Liquid والغازية Gas. وقد يؤدي تغيُّر درجة الحرارة أو الضغط، أو كليهما إلى تغيُّر حالة المادة. تتميَّز حالات المادة الثلاث بخصائص عامَّة، بغض النظر عن ماهية المادَّة الكيميائية، كما هو مبيّن ومُلخَّص في (الجدول ١-١).

مصطلحات علمية

■ المادّة Matter: أي شيء له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ. وللمادّة ثلاث حالات فيزيائية هي: الصّلبة والسائلة والغازية.

تختلف الحالات الفيزيائية الثلاث للمادة في كيفية استجابتها لتغيُّرات الضغط ودرجة الحرارة. فالحالات الثلاث تُظهِر عمومًا زيادةً في حجم المادّة (تمدُّدًا) عند ارتفاع درجة الحرارة، ونقصًا في حجمها (انكماشًا) عند انخفاض درجة الحرارة. ولكن في الحالتين، يكون التأثير في الغازات أكبر كثيرًا من التأثير في المادَّة الصُّلبة أو السائلة.

يمكن بسهولة تقليص حجم الغاز عند درجة حرارة ثابتة؛ وذلك بزيادة الضغط الواقع عليه. وفي حين أن ضغط الغازات يتم بكل سهولة، تُضغط السوائل بمقدار بسيط. أما المادَّة الصُّلبة فلا تتأثّر بتغيُّر الضغط.

التغيُّرات في الحالة الفيزيائية

يُمكن للتغيُّرات الكبيرة في الضغط ودرجة الحرارة أن تسبّب تغيُّرات في حالات المادَّة، تتعدّى الانكماش والتمدُّد؛ كأن تؤدّي إلى تغيُّر حالتها الفيزيائية. يُبيّن (الشكل ١-١) التغيُّرات بين حالات المادّة الثلاث، وهي تغيُّرات تحدث برفع درجة حرارة المادّة أو خفضها عند الضغط الجوّي العادي (1 atm).

الانصهار والتجمُّد


يُطلَق على درجة الحرارة التي تتحوَّل عندها مادّة صُلبة نقيّة إلى سائل، اسم درجة الانصهار Melting صُلبة نقيّة إلى سائل، اسم درجة الانصهار point ويحدث هذا التحوُّل دائمًا عند وصول المادة النقية إلى درجة حرارة معيّنة، (الشكل ١-١). وعند درجة الحرارة نفسها، يحدث التحوُّل المُعاكس من الحالة السائلة إلى الصلبة، وتُسمّى عندئذ درجة التجمُّد التجمُّد Freezing point. تكون درجتا الانصهار والتجمُّد لأي مادة متماثلتين. فانصهار الماء النقي مثلًا وتجمُّده، يحدثان عند درجة حرارة ٥ ((الصورة ١-١)).

لفلز الغاليوم درجة انصهار أعلى قليلًا من درجة حرارة الغُرفة. لذلك، تجده ينصهر عند وضعه على راحة اليد، (الصورة ١-٢).



الصورة ١-١ قطعة جليد عائمة على بُحيرة. يكون الماء الصلب (الجليد) أقلَّ كثافة من الماء السائل، فيطفو على سطح الماء. الماء هو إحدى المواد القليلة التي تكون في الحالة الصلبة أقلَّ كثافة من الحالة السائلة

التدفق	الشكل	الكثافة	الحجم	الحالة الفيزيائية
لا تتدفَّق	لها شکل محدّد	مُرتفعة	لها حجم ثابت	الصلبة
تتدفَّق عادةً	ليس لها شكل مُحدَّد، تأخذ	مُتوسطة إلى	لها حجم ثابت	السائلة
بسهولة	شكل الوعاء الذي توضع فيه	مُرتفعة		
تتدفَّق بسهولة	ليس لها شكل مُحدَّد، تأخذ	مُنخفضة	ليس لها حجم ثابت بل تنتشر	الغازية
	شكل الوعاء الذي توضع فيه		لتملأ الوعاء الذي توضع فيه	



الشكل ١-١ التغيُّرات في الحالة الفيزيائية، وتأثير زيادة درجة الحرارة تحت الضغط الجوي العادي

المادة النقية لها درجة انصهار ودرجة غليان مُحدَّدة. فعند قياس هذه الدرجات يمكنك تحديد ما إذا كانت المادة نقية. وباستخدام البيانات يمكنك أيضاً تحديد نوع المادة.




الصورة ١-٢ فلزّ الغاليوم ينصهر على راحة اليد

التبخُّر والغليان والتكثُّف

إذا تُرِك سطح السائل معرَّضًا للهواء، فإن جُسيماته تتبخَّر. فبقع الماء تتبخّر عند درجة حرارة الغرفة. وكذلك تجفّ البرك بعد توقُّف المطر!

نطلق على عمليّة تحوّل السوائل إلى غازات وفقًا لهذه الطريقة، اسم التبخُّر عند الطريقة، اسم التبخُّر عند سطح السائل. ويكون تبخُّر السائل أسرع إذا كانت مساحة السطح كبيرة، وإذا ارتفعت درجة حرارة السائل.

وعند درجة حرارة معينة، يصبح السائل ساخنًا إلى حدّ يكفي لتكوُّن الغاز داخله، وليس فقط على سطحه (الشكل ١-٢). فتظهر فقّاعات الغاز داخل السائل وتخرج على شكل بخار. وتُعرف تلك العملية بالغليان Boiling. وهي تحدث لكل سائل نقي عند درجة حرارة مُحدّدة تُسمّى درجة الغليان Boiling point. فالماء يتبخّر نوعًا ما بسهولة



الشكل 1_٢ الكرات الزرقاء تمثّل جُسيمات المادة في الحالتين السائلة والغازية.

(أ) عملية التبخّر تحدث على سطح السائل فقط. (ب) عملية الغليان تحدث داخل السائل وعلى سطحه.

وله درجة غليان مقدارها (°C). ويُعدّ سائلًا مُتطايرًا Volatile إلى حدِّ ما. أما الإيثانول، الذي تبلغ درجة غليانه °C ، فهو أكثر تطايرًا Volatility من الماء؛ وبالتالي يتبخّر بسرعة أكبر.

السائل المُتطاير Volatile سائل يتبخَّر بسهولة، وله
 درجة غليان منخفضة نسبيًا.

التكثُّف Condensation عملية مُعاكسة لعملية التبخُّر، تحدث عادةً بالتبريد. وحيث إن الغازات هي أكثر حالات المادة تأثرًا بتغيّرات الضغط، فإننا عند درجات الحرارة العادية نستطيع تكثيف بعض الغازات إلى سوائل بزيادة الضغط، دون الحاجة إلى التبريد.

ويمكن أن تتغيَّر درجة غليان السائل، إذا تغيَّر الضغط المُحيط. ففي العادة، تُحدَّد درجة الغليان في الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (الضغط الجوي أو الضغط التقياسي (atmospheric pressure (1 atm)). فإذا انخفض مقدار الضغط المُحيط، تتخفض درجة الغليان. إذ تبلغ درجة غليان الماء عند الضغط القياسي ° 100، وتتخفض عن ذلك في الجبال الشاهقة. بالمقابل، إذا زاد الضغط التي تُستخدَم ترتفع درجة الغليان. ففي طناجر الضغط التي تُستخدَم لطهي الطعام، ترتفع درجة غليان الماء إلى ما يقارب المُرتفعة هذه.

النموذج الجُسَيمي الحركي للمادة

تتكوَّن جميع المواد من جُسيمات بالغة الصغر وهي تشكّل تركيب المواد في الحالات الثلاث. وقد استطاع النموذج الجُسَيمي الحركي للمادة وصف هذه الحالات، والتغيُّرات التي تحدث فيما بينها استنادًا إلى مفهوم حركة الجُسيمات.

أنواع الجُسيمات

تتكوَّن المادَّة من جُسَيمات، نستطيع تخيُّلها على شكل كُرات صغيرة. وتشمل هذه الجُسَيمات ثلاثة أنواع أساسية وهي: الذرّات Atoms والجُزيئات Molecules والأيونات Solecules.

تُعدّ الذرّة أصغر جُسَيم في المادة يمكن أن يوجد بشكل منفرد.

أما الجُزيئات، فهي جُسيمات المادّة التي تشكّلت من اندماج ذرّتين أو أكثر.

وتتصف الأيونات بأنها جُسيمات تحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة.

يُمثّل (الشكل ١-٣) ملخَّصًا لتنظيم الجُسَيمات في حالات المادّة الثلاث، ويساعد على تفسير مختلف خصائصها الفيزيائية. فالجُسَيمات في الغاز تكون مُتباعدة جدًا، في حين تكون مُتراصّة معًا في السائل أو في الحالة الصلبة. ويُعرَف الفراغ بين الجُسَيمات باسم المسافات بين-الجُزيئية (Intermolecular space (IMS). ففي الغاز، تكون المسافات بين-الجُزيئية كبيرةً ويمكن تصغيرها بزيادة المسافات بين-الجُزيئية كبيرةً ويمكن تصغيرها بزيادة الضغط الخارجي على الغاز، لأن الغازات قابلة للانضغاط. لكن في السائل، تكون المسافات بين-الجُزيئية أصغر بكثير. وبالتالى تكون قابلية السوائل للانضغاط صغيرة جدًّا.

تذكّر


مع أن الجُسَيمات في السائل تكون مُتقاربة جدًا إلا أنها تستطيع أن تتحرَّك وتتجاوز بعضها بعضًا.

المبادئ الرئيسية للنموذج الجسيمي الحركي:

- تتكوَّن المواد جميعها من جُسيمات بالغة الصغر (تحتوي المواد المختلفة على أنواع مختلفة من الجُسَيمات، مثل الذرّات والجُزيئات والأيونات).
- تكون الجُسيمات في حركة دائمة (وكلما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفع معها مُتوسِّط طاقة الجُسيمات وبالتالي تزداد حركتها).
- تكون حُرية حركة الجُسَيمات وترتيبها مختلفين بين حالات المادّة الثلاث.
 - ينتج ضغط الغاز عن اصطدام ذرّات الغاز أو جُزيئاته بجدران الوعاء الذي يحويه. فكلما كانت الاصطدامات بالجدران أكثر، كان الضغط أكبر.

الغاز Gas


تكون الجُسَيمات في الغاز: • غير مُنتظمة تمامًا • مُنتشرة بشكل مُتباعد جدّا، مقارنة بالحالتين السائلة والصلبة • تتحرَّك عشو ائيًّا



عند التسخين، تتحرَّك الجُسَيمات بسرعة أكبر، وتمتلك بعض الجُسَيمات طاقة كافية للانفلات من السطح، فتحدث عملية التبخر. ومع ارتفاع درجة الحرارة، يزداد عدد الجُسَيمات التي تملك ما يكفي من الطاقة للانفلات. ويكون التبخر أسرع عند درجات الحرارة المُرتفعة، وعند درجة الغليان، تكون الجُسَيمات قد امتلكت طاقة كافية لكسر قوى التجاذب بينها، فتتحرك بسرعة كبيرة جدًا، وينفصل بعضها عن بعض؛ وعندها يغلى السائل.

السائل Liquid

تكون الجُسَيمات في السائل: • مُتراصّة إلى حد ما • في ترتيب غير منتظم • قادرة أن تتحرَّك ويتجاوز بعضها



عندما ترتفع درجة الحرارة، تكسب الجُسَيمات طاقة، وتهتز بقوة أكبر، بحيث تشغل حيزًا أكبر، ما يؤدي إلى تمدَّد المادّة الصلبة. في النهاية، تمتلك الجُسَيمات طاقة كافية لكسر القوى التي تبقى جُسيمات الشبكة متماسكة. عندئذ يمكن للجُسيمات أن تتحرّك؛ فتنصهر المادّة الصلبة.


المادّة الصلبة Solid

تكون الجُسَيمات في المادّة الصلبة: • متراصّة بقوة معًا

- في ترتيب منتظم أو شبكي • غير قادرة على الحركة بحرية،
- ولكنها ببساطة تهتز في أماكنها الثابتة

الشكل ١-٣ النموذج الجُسَيمي الحركي وتفسير التغيُّرات في الحالة الفيزيائية

وتُساعد الطريقة التي تترتَّب بها الجُسَيمات في حالات المادّة الثلاث على تفسير التغيّرات في درجة الحرارة، عندما يتم تسخين مادة أو تبريدها. ويُلخّص (الشكل ١-٤) تغيُّرات الطاقة التي تحدث في المراحل المختلفة لتجربة منحنى التسخين.



الشكل ١-٤ تغيُّرات الطاقة التي تحدث خلال عملية التسخين. وعند عكس التجربة، نحصل على منحنى التبريد، فتبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء التكثيف والتجميد.

تأثير الشوائب على درجات الانصهار والغليان

يُعد ماء البحر ماء غير نقى. ويمكنك التأكّد من ذلك إذا وضعت كمّية منه في طبق تبخير، وسخَّنت الطبق حتى يتبخّر الماء. ستلاحظ بقاء كمّيّة من «الملح» في الطبق. وهذا يفسِّر لماذا يتجمَّد ماء البحر عند درجة حرارة أدنى من درجة تجمُّد الماء النقي (C° 0)، ويغلي عند درجة حرارة أعلى من درجة غليان الماء النقى (C° 100). وتُظهر المواد الأخرى التي تحتوي على شوائب اختلافات مماثلة.

فوجود الشوائب في المادة يجعل تحديد درجات انصهارها وغليانها بدقّة غير ممكن. ذلك أنها تنصهر، أو تغلى أحيانًا، ضمن مدى من درجات الحرارة، وليس عند درجة حرارة مُحدّدة.

يؤدّي وجود شوائب في المادّة إلى:

- خفض درجة انصهار المادة.
 - **رفع** درجة غليان المادة.



ٰ تذکّر

أن للمادّة النقيّة درجتَيِّ انصهار وغليان مُحدَّدتين ودقيقتين. لكن مع وجود الشوائب تتغيّر كل من درجتي الانصهار والغليان إلى مدى من درجات الحرارة في كل حالة.


مُنحنَيات التبريد والتسخين

يمكننا استخدام جهاز قياس درجة الانصهار المبين في (الشكل ١-٥) من أجل تتبع درجات حرارة عينة قبل الانصهار وبعده. ويمكن استخدام النتائج لرسم منحنى التسخين، كما هو مُبين في (الشكل ١-٦). يمكن أيضًا استخدام جهاز مُشابه لرصد التغير في درجات الحرارة ورسم منحنى التبريد، لكن يجب وضع ميزان الحرارة (الثرمومتر) داخل الأنبوبة التي تحتوي على المادة السائلة أو الغازية المُراد دراستها.


يُبيِّن (الشكل ١-٦) كيف تتغيَّر درجة الحرارة عند تسخين عينة نقيَّة من مادة النفثالين الصُّلبة بشكل مطّرد. فهي تتصهر عند درجة حرارة °C بالضبط. ويلاحظ أن درجة الحرارة تبقى ثابتة ولا تتغيَّر أثناء عملية الانصهار، ثم تعود لترتفع بعد انصهار النفثالين كليًّا. ويتضح أن منحنى تسخين مادة نقية يبقى ثابتًا أثناء عملية الانصهار، في حين يتضَّح من منحنى التسخين للشمع، الذي يتكوَّن من مخلوط من المواد، أن الشمع ينصهر وفق مدًى Range

يمكننا أن نستخدم الجهاز نفسه لتسخين سائل، حتى يصل إلى درجة غليانه. حيث تثبت درجة الحرارة أيضًا حتى يغلي السائل بكامله. ويمكن آنذاك تنفيذ العملية العكسية، بتبريد عينة من الغاز، حيث ينتج من ذلك منحنى التبريد المُبيَّن في (الشكل ١-٧).


يكون منحنى التبريد أفقيًا للمادة النقية، عندما يتكثّف الغاز إلى سائل، أو عندما يتجمَّد السائل.



الشكل 1-٥ جهاز قياس درجة انصهار المادّة الصُّلبة. يُستخدَم حمّام مائي لقياس درجات الانصهار التي تقلّ عن ° 100، ويُستخدَم حمّام من الزيت لقياس درجات الانصهار التي تزيد على ° 100



وتظهر التجارب الآنفة الحاجة إلى امتصاص طاقة حرارية لتحويل المادّة الصُّلبة إلى مادّة سائلة، والمادّة السائلة إلى غاز. وفي المقابل يتمّ تحرير طاقة حرارية خلال العمليات العكسية.



الشكل ١-٧ منحنى تبريد مادَّة نقيّة. تبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء تكثُّف الغاز، وكذلك أثناء تجمُّد السائل. ولخفض درجة حرارة الحمام المائي إلى ما دون °C يُستخدَم مخلوط من الملح والجليد

أثناء انصهار المادّة الصلبة (النقية)، أو غليان السائل النقي، تبقى درجة الحرارة ثابتة حتى تنتهي العملية كليًّا. ويحدث الأمر نفسه في العمليات العكسية؛ أي لدى تكثُّف الغاز أو تجمُّد السائل.

نشاط ۱-۱

رسم منحنی تبرید

المهارات:

- يُبين، بطريقة عملية، معرفته بكيفية الاستخدام الآمن
 للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من
 التعليمات المناسبة).
 - يُنجز التجربة ويُسجِّل الملاحظات، والقياسات والتقديرات.
 - يُفسِّر الملاحظات التجريبية والبيانات، ويقيّمها.
 - في هذه التجربة، سوف ترسم منحنيات تبريد لمادَّتين مختلفتين A و B.
 - ႔ ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
 - البس القفازين الواقيين عند الضرورة، أثناء إجراء هذه
 التجرية.

الطريقة

- ا سخِّن الماء في كأس زجاجية سعة (250 mL) لتحضير حمّام مائي. يجب أن يكون الماء عند درجة حرارة حوالي (°C 90 °C).
- Y ضع أنبوبتَي تسخين تحتوي كل منهما على عيّنة واحدة من المواد الصلبة، A و B في الحمّام المائي.
 - تعندما تنصهر المواد الصلبة، ضع ميزان حرارة (ثرمومترًا) في كلتا الأنبوبتين. يجب أن تتوفَّر كمية كافية من السائل لغمر مستودع ميزان الحرارة.
- أخرج الأنبوبتين من الحمّام المائي وضفهما في حامل
 الأنابيب لتفادى وقوعهما.
- قس درجة الحرارة في كل أنبوبة وسجِّل قيمتها. شغِّل ساعة الإيقاف.
- آ قس درجة الحرارة في كل أنبوبة وسجِّل قيمتها بعد كل دقيقة حتى تبلغ درجة الحرارة (°C).
 - ارسم تمثيلًا بيانيًا لمُنحنى التبريد لكل من المادتين،
 A و B، بوضع الزمن على المحور السيني ودرجة الحرارة على المحور الصادى.

أسئلة

- أي المادتين تُعتبر مادة نقية؟ فسِّر إجابتك.
- كيف يمكنك تحسين إجراءاتك للحصول على نتائج
 أفضل.

أسئلة

- ١-١ ما نوع التغيُّر الفيزيائي في كل من الحالات الآتية؟
 أ. من السائلة إلى الصلبة.
- ب. من السائلة إلى الغازية عند درجة حرارة مُحدَّدة. ج. من الغازية إلى السائلة.
- ٢-١ ما تأثير وجود الشوائب في سائل على درجة تجمُّده؟
- ۲-۱ ارسم منحنى التبريد للماء من (℃ 80) إلى (℃ 20-)،
 مُسجِّلًا ما يحدث فى الأجزاء المختلفة من الرسم.
- 4-1 ما المقصود بالمادة المُتطايِرة Volatile عندما يتم استخدامها في الكيمياء؟
- ١-٥ ربِّ السوائل الثلاثة الآتية وفق قابليتها للتطاير
 ٧٠ (درجة غليانه الأكثر إلى الأقلّ: الماء (درجة غليانه ١١٦.9 ° ١١٦.9)، حمض الإيثانويك (درجة غليانه ٥٠ ١١٦.9).
 الإيثانول (درجة غليانه ٥٠ ٣٥).

أنواع المخاليط

يتَّصف عالمنا بأنَّه معقَّد جدًا؛ لما فيه من مواد نقية كثيرة جدًا، ولتتوُّع طرائق اختلاطها معًا.

ونحن في حياتنا اليومية لا «نتعامل» غالبًا مع المواد النقية Pure. فالهواء الذي نتنفسه ليس مادة نقية، بل هو مخلوط من عدة مواد غازيَّة. والماء الذي نشريه ليس نقيًا (أي ماءً مُقطِّرًا) وإنما هو أيضًا مخلوط من العديد من المواد (الذائبة في الماء).

يتكون كل مخلوط Mixture من مادّتين نقيّتين على الأقل، قد تكون أي منهما مادّة صُلبة أو سائلة أو غازية. وهنالك طرائق مُتنوّعة يمكن أن تختلط بواسطتها الحالات الثلاث للمادة معًا. فعندما يكون اختلاط الحالات كاملاً تتشكّل حالة مُفردة أو طور واحد (طبقة واحدة) «لا يمكنك أن ترى الحدود الفاصلة بينها». ويُستخدم مصطلح المحلول وصف هذا النوع من المخاليط.

فمثلاً، عندما يذوب ملح صلب في الماء السائل، ينتج مخلوط سائل، هو المحلول الملحي (الشكل $-\Lambda$). ولمزيد من التوضيح فإن المادّة الصلبة (أو السائلة أو الغازية) التي تذوب في السائل تُسمّى المذاب Solute، والسائل الذي تذوب فيه هذه المادّة يُسمّى المذيب Solvent.

مادة صُلبة قابلة للإذابة قابلة للإذابة ذوبان ذوبان فران مادة صُلبة في المادة صُلبة في المادة صُلبة في المادة صُلبة في المادة المادة صُلبة في المادة في المادة

الشكل ١ـ٨ عندما تذوب مادة (المذاب) في مادة أخرى (المُذيب)، فإن جُسَيمات المذاب تتوزّع في المُذيب بشكل كامل

المحاليل

تتعدَّد الطرائق التي تختلط فيها المواد ببعضها، ولكي نطلق على مخلوط مُعيَّن مُكوِّن من مادتين، اسم محلول نطلق على مخلوط أن تذوب إحدى المواد في المادة الأخرى.

ولعل أكثر أنواع المحاليل شهرة هي تلك المُكوَّنة من مادة صلبة مذابة في سائل، وجدير بالذكر أن ثلثي مساحة سطح الكرة الأرضية مُغطاة بمحاليل مكوَّنة من أملاح مُتنوّعة ذائبة في الماء، وتكون موزّعة بشكل كامل في المذيب، فلا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة. كما توجد مواد أخرى لا تكون صلبة وهي ذائبة في مياه البحار كغازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون اللذين يُعتبران من الغازات الضرورية للحياة في المحيطات.

وتوجد أيضًا محاليل مُكوّنة من سائل مُذاب في سائل آخر ولكنها الأقل شيوعًا. فالكحول الطبّي يختلط (يذوب) بشكل كامل مع الماء ولا ينفصل المخلوط (المحلول) إلى طبقات من الكحول والماء (حتى لو كانت نسبة الكحول مُرتفعة جدًا). فالكحول والماء يمتزجان Miscible معًا بشكل كامل، ويكوّنان محلولًا.

ذوبانية المواد الصلبة في السوائل

تُعدّ المحاليل المُكوَّنة من مواد صلبة مُذابة في سائل أكثر أ أنواع المخاليط أهمّية وشيوعًا.

من المعروف أن الماء هو المذيب الأكثر شيوعًا واستخدامًا، لكن توجد مذيبات سائلة أخرى مُهمّة وهي المذيبات العضوية، مثل الإيثانول، والبروبانون (الأسيتون)، وثلاثي كلوروميثان (الكلوروفورم). وتكتسب أهمّيتها من أنها تستطيع في الغالب إذابة مواد لا تذوب في الماء. تُسمّى المادة التي تذوب في مُذيب بالمادة المذائبة Soluble، أما المادة التي لا تذوب فتُسمّى بالمادة غير الذائبة المادة التي لا تذوب فتُسمّى بالمادة غير الذائبة المنابة على معلول كبريتات النحاس (اا)، في عندما نذيب مادة صُلبة مثل كبريتات النحاس (اا)، في كمّية ثابتة من الماء نحصل على محلول كبريتات النحاس (اا)، وعند إضافة المزيد من المُذاب يصبح المحلول أكثر تركيزًا. فالمحلول المُركّز Concentrated يحتوي على كمّية

كبيرة (نسبة مُرتفعة) من المذاب، أما المحلول المُخفَّف Dilute فيحتوي على كمية ضئيلة (نسبة مُنخفضة) منه. ويُعرف تركيز المحلول Concentration بأنه كمية المذاب الموجودة في حجم مُحدَّد من المحلول. ويبلغ هذا الحجم عادة 11.

وعند الاستمرار في إضافة المزيد من المادّة الصلبة، سنصل إلى حدٌ، تتوقّف فيه المادّة عن الذوبان عند درجة حرارة معيّنة؛ ونحصل عندئذ على ما يُسمّى بالمحلول المُشبّع Saturated solution. ويُعرف تركيز المذاب في محلول مشبّع بذوبانية Solubility ذلك المُذاب عند درجة حرارة مُعيّنة.

ولإذابة المزيد من المادة الصلبة، يجب رفع درجة حرارة المحلول. وعند تبريد هذا المحلول، فإنه قد يحتفظ بكمية قليلة من المذاب عند درجة حرارة أدنى، في حين أن بعضًا منه يتبلور.

مصطلحات علمية

■ المحلول Solution مخلوط من مادتين، هما: المُذاب Solute: المادّة التي تذوب.

المُذيب Solvent: السائل الذي تذوب فيه المادّة المُذابة.

الانتشار في الموائع

تُساعدنا فكرة أن الموائع (السوائل والغازات) مُكوَّنة من جُسيمات مُتحرِّكة على تفسير عملية انتشارها Diffusion.

عند وضع بلّورات برمنجنات البوتاسيوم في قعر طبق يحتوي على الماء، ثم يُترك فترة من الزمن، نلاحظ في بداية الأمر ذوبان المادة الصلبة في الماء ليصبح لون الماء الذي يُحيط بالبلورات أرجوانيًا (الصورة ١-٣)، حيث تتحرَّك الجُسَيمات من سطح البلورات إلى داخل الماء. وفي النهاية تذوب البلّورات كليًا ويصبح لون المحلول كلّه أرجوانيًا، لأن جُسَيمات المادة الصّلبة توزّعت بشكل مُتجانس في الماء، وهذا التوزُّع يُمثل عملية الانتشار.




الصورة ١-٣ ذوبان برمنجنات البوتاسيوم وانتشارها في الماء

وتُعتبر عملية الانتشار في المحلول مهمة عندما يكون المذاب غازًا. وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة في التنفُّس ذلك أن عملية الانتشار تُسهم في حركة الأكسجين من الرئتين نحو الدم، وفي حركة ثاني أكسيد الكربون من الدم نحو الرئتين.


انتشار الغازات

إذا وضعنا في وعاء زجاجي بضع نقاط من سائل البروم وأحكمنا تغطيته سوف يمتلئ بغاز بني اللون، بعد زمن قصير. ذلك أن البروم يتبخّر بسهولة، ويملأ غازه الوعاء الذي يحتوي عليه كليًا (الصورة ١-٤). وهكذا نُلاحظ أن الغازات تنتشر لتملأ الفراغ المُتاح لها كليًّا. وتكتسب عملية الانتشار أهمية في أنها تتيح لنا «الإحساس» بالعالم من حولنا. فهذه العملية هي التي تنقل الروائح إلينا، سواء أكانت محبَّبة أم مؤذية.



الصورة ١-٤ ينتشر (يتوزّع) بخار البروم في الوعاء بأكمله ليملأ الفراغ بشكل تام

لا تنتشر الغازات جميعها بالسرعة نفسها. ويظهر تفاوت سرعة الانتشار في التجربة التي يُبيّنها الشكل (1-9), والتي توضّح كيف تتفاعل أبخرة كل من الأمونيا وحمض الهيدروكلوريك عندما يوضعان معًا، فتنتج «حلقة دخان أبيض» من كلوريد الأمونيوم. وكما يتضح من الشكل (1-9) فإن حلقة الدخان الأبيض لا تتمركز في منتصف الأنبوبة بل تكون أقرب إلى الطرف الذي يحتوي على حمض الهيدروكلوريك؛ ذلك لأن جُزيئات الأمونيا أخفّ من جُزيئات الحمض (جُزيئات كلوريد الهيدروجين) فتنتشر بسرعة أكبر.



الشكل ١-٩ تنتشر أبخرة كل من الأمونيا وحمض الهيدروكلوريك بسرعات متفاوتة

مصطلحات علمية

■ الانتشار Diffusion: هو انتقال المواتع من منطقة ذات تركيز مُرتفع باتِّجاه منطقة ذات تركيز مُنخفض نتيجة لحركة جُسيماتها العشوائية، ممّا يؤدّي في النهاية إلى تجانس تركيز تلك الجُسَيمات في كامل المخلوط.

- يحدث الانتشار عندما تختلط المواد المختلفة نتيجة
 حركات جُسيماتها العشوائية. وفي النهاية تنتشر
 الجسيمات بالتساوي أي يكون تركيزها هو نفسه
 طوال الوقت.
 - لا تحدث عملية الانتشار في المواد الصلبة.
 - تكون عملية الانتشار في المواد السائلة أبطأ بكثير مما هي عليه في الغازات.

تذكّر

أن الفكرة الأساسية من عملية الانتشار هي أن الجُسيمات تنتشر لتملأ الفراغ المُتاح لها.

يُشتق من النموذج الجسيمي للمادة نقطتان مهمّتان تتعلّقان بموضوع الانتشار، وهما:

- تتحرّك الجُسيمات الثقيلة ببطء مقارنة بالجُسيمات الأخفّ، عند درجة الحرارة نفسها. وتنتشر الجُزيئات الكبيرة ببطء أكثر من الجُزيئات الأصغر.
 - يزداد متوسِّط سرعة الجُسيمات مع ارتفاع درجة الحرارة.

نشاط ۱-۲

استقصاء الانتشار - تطبيق عملي

المهارات:

- يُبين، بطريقة عملية، معرفته بكيفية الاستخدام الآمن
 للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من
 التعليمات المناسبة).
 - يُنجز التجربة ويُسجِّل الملاحظات، والقياسات والتقديرات.
 - يناقش المُلاحظات التجريبية والبيانات، ويُقيّمها.

أولًا: انتشار الغازات


تُعدّ هذه التجربة تطبيقًا عمليًا لانتشار الغازات، حيث تلتقي جُزيئات الأمونيا وكلوريد الهيدروجين في أنبوبة زجاجية طويلة، فتتفاعل وتنتج حلقة دخان (أبيض).

ويُبيّن هذا النشاط كيفية تتبُّع حركة الغازات باستخدام الكواشف التي توضع على طول الأنبوبة. ويمكن إجراء القياسات لتقدير سرعة انتشار كل من الغازيَن.

- ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- البس القفازين الواقيين عند الضرورة، أثناء إجراء هذه التجربة.
- يُسبّب حمض الهيدروكلوريك والأمونيا المُركَّزان التآكل
 ويطلقان أبخرة ضارَّة؛ ويُسبَّبان حروقًا جلدية.
 - نفّذ العرض التوضيحي في خزانة طرد الغازات أو في مختبر ذي تهوئة جيدة.

نشاط ۱-۲

الطريقة



ملاحظة: توضع أوراق تبّاع الشمس الحمراء والزرقاء عند جهتَي الأنبوبة المُتقابلتَين وعلى امتدادها.

- ادفع أحد طرفي ورقة تبّاع الشمس الحمراء برأس قلم وثبّت الورقة في مكانها باستخدام القلم.
 - ٢ أفلت ورقة تبّاع الشمس الموصولة بالقلم داخل الأنبوبة الزجاجية. كرِّر هذه الخطوة مع ورقة تبّاع الشمس الزرقاء.
- ثبت ورقتي تبّاع الشمس داخل الأنبوبة الزجاجية
 باستخدام شريط لاصق، بحيث تكونان مُتقابلتين داخل
 الأنبوبة.
 - بلل أوراق تبّاع الشمس بإمالة الأنبوبة وإمرار قطرات من الماء المُقطّر من قارورة الغسيل.
- ثبِّت قطعتَين من الصوف القطني على الطرف الداخلي للسدادتين باستخدام الشريط اللاصق.
- على قطعة الصوف القطني عند إحدى الجهتين على قطعة الصوف القطني عند إحدى الجهتين مستخدمًا القطّارة ، وبضع قطرات من محلول الأمونيا المركَّز على قطعة الصوف القطني المُثبّتة على الجهة الأخرى باستخدام قطّارة أخرى.
 - ادفع بسرعة السدادتين المتقابلتين داخل الأنبوبة،
 وتأكد من وضعهما في مكانيهما بالتزامُن.
 - ٨ راقب ما يحدث لمدة 15-10 دقيقة.


أسئلة

- ١ سجِّل مشاهداتك.
- ٢ ارسم التجربة ووضِّح على الرسم موقع تكوُّن حلقة الدخان.
- فسِّر تكوُّن حلقة الدخان الأبيض مع كتابة معادلة التفاعل الكيميائي اللفظية.
 - الاستنتاجات التي يمكنك التوصُّل إليها حول مُعدَّل انتشار الغازين؟

ثانيًا: الانتشارفي السوائل

توضِّح هذه التجربة الانتشار في سائل. يظهر الانتشار من خلال تكوين راسب نتيجة لانتشار الأيونات.

الطريقة



- ١ ضع طبق بترى على ورقة بيضاء. املأه بماء مُقطَّر.
- Y ضع بوساطة الملقط بلُّورة من نترات الفضَّة عند أحد جوانب طبق بتري وضع بلُّورة من يوديد البوتاسيوم عند الجانب المقابل.
 - ٣ لاحظ ما يحدث عندما تبدأ البلُّورتان بالذوبان.

أسئلة

- ١ سجِّل مُشاهداتك.
- ٢ ما الناتج الذي يتكوّن خلال هذه التجربة؟
- اكتب مُعادلة التفاعل الكيميائي اللفظية لتوضِّح التغيُّر الذي حدث.
- ك ما العوامل التي تتحكَّم بموقع تكوِّن المادة الصلبة في طبق بتري؟
 - لماذا لا تتكوّن المادة الصلبة في منتصف طبق بتري؟

أسئلة

- 7-1 لخّص الاختلافات بين حالات المادّة الثلاث من حيث ترتيب جُسيماتها وحركتها.
- ١-٧ أي الغازين ينتشر بسرعة أكبر: الأمونيا أم كلوريد
 الهيدروجين؟ صف باختصار تجربة تبين ذلك الاختلاف بطريقة عملية.
 - ١-٨ ما الغاز ذو سرعة الانتشار الأكبر بين جميع الغازات؟

نقاوة المواد وماهيتها

ربما كان قياس درجات الانصهار والغليان من أكثر الاختبارات المُستخدَمة عمومًا لفحص نقاوة Purity المواد. وكما رأينا سابقًا، فإن الشوائب تخفض درجة انصهار المادّة، وترتفع درجة غليانها. ويمكنها أيضًا أن تجعل درجات الحرارة تلك أقلّ دقة. وقد تمّ قياس درجة حرارة الكثير من المواد المُتنوّعة وبالتالي بات ممكنًا التعرُّف إلى ماهية ldentity مادة غير معروفة من خلال البحث في تلك القيم المقيسة لمواد نقية ومعروفة.

تكتسب عملية التنقية أهمية بالغة في الكثير من مجالات الصناعات الكيميائية، فالعقاقير Drugs الطبية يجب أن تكون عند أعلى درجة من النقاوة؛ وذلك لأن وجود أي مواد مُلوِّثة فيها، حتى وإن كانت بكميّات ضئيلة جدًّا، قد تكون له آثار جانبية ضارّة. كما أن الأطعمة والأشربة المُصنعة التي نتناولها قد تحتوي على مواد ذات تأثير سلبي على بعض الأشخاص، ومن بينها مُلوَنات الطعام Food coloring التي تُضاف إلى الأطعمة والأشربة لتحسين مظهرها.

وبشكل عام تخضع مُلوِّنات الطعام لرقابة شديدة، حيث وُضعت قوائم لرموز الملوِّنات المسموح بها، ابتداء بالمُلوِّن الذي يحمل الرمز E100 وانتهاء بالمُلوِّن E180. وجرى مؤخرًا حظر الكثير من الملوِّنات التي كانت إضافتها مسموحة من قبل. حيث تبيّن أن هناك أشخاصًا يتضرّرون حتى من بعض المُلوِّنات المسموحة. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، المادة المُلوِّنة الصفراء المُسمّاة تارترازين (E102) الموجودة في الكثير من المشروبات، والصلصات، والحلويات، والوجبات الخفيفة، فرغم أنها غير ضارّة

بمعظم الناس، ولكنها تُسبّب لبعض الأطفال فرطًا في النشاط وبعض أشكال الحساسية، مثل الربو. ورغم توفُّر التنظيم والمراقبة الحكومية على تلك المواد، فإن على الأفراد أن يتعاملوا معها بحذر، وأن يعرفوا مدى تأثير بعض الأطعمة عليهم.

وتُعد الكروماتوجرافيا من الاختبارات التي تُستخدَم للتحقُّق من نقاوة المادّة. وسيتم التوسُّع في دراسة كروماتوجرافيا الورق في الصفحات الآتية.

١-١ فصل المواد وتنقيتها

لفهم العالم المادي من حولنا، نحتاج إلى طرائق فصل فيزيائي للمخاليط المُتنوِّعة والكثيرة التي تصادفنا. تتوفّر لنا تقنيات فيزيائية كثيرة لإجراء عمليات الفصل الضرورية (الجدول ١-٢). وهذه العمليات تعتمد على الاختلاف في الخصائص الفيزيائية للمواد الموجودة في المخلوط.

طريقة الفصل	المخلوط
استخدام الطرائق التي	مادّة صلبة + مادّة صلبة
تعتمد على الاختلاف في	(مخلوط مسحوق)
الخصائص، مثلاً: الكثافة،	
الذوبانية، المغناطيسية	
ترشيح	مُعلِّق مادة صُلبة في سائل
للحصول على المادة	محلول مادة صلبة في
الصلبة: استخدام التبخير	سائل
(التبلور) وللحصول على	
السائل، استخدام التقطير	
تقطير تجزيئي	سائلان اثنان (أو أكثر)
_	مخلوطان معًا (قابلان
	للمزج)
كروماتوجرافيا	محلول مُكوَّن من مادَّتين
	مُختلفتين (أو أكثر) ذائبتين
	في سائل

الجدول ١-٢ فصل أنواع مختلفة من المخاليط


تعتمد فاعلية طريقة الفصل لمخلوط ما على:

- نوع المخلوط
- المادّة المراد استخلاصها من المخلوط

فصل المواد الصلبة غير الذائبة عن السوائل

يُعتبر فصل مُكوِّنات هذا النوع من المخاليط هو الأسهل. فغالبًا ما يكفي ترك مُعلَّق المادة الصلبة الموجودة في السائل يستقر حتى تتحقَّق عملية الفصل، خاصة عندما تكون حُبيبات المادِّة الصلبة كبيرة بشكل كاف. وبمجرَّد ترسُّب المادِّة الصلبة في قعر الوعاء، يُسكب السائل بعناية، في عملية تُسمّى الترويق Decanting.

ويُعدّ الترشيح Filtration الطريقة الفعّالة والمُفيدة عمومًا لفصل المواد الصلبة غير الذائبة عن السوائل (الشكل ا١٠-١).





الشكل ١٠-١ تفصل عملية الترشيح مادة صُلبة غير ذائبة عن السائل

فهذه العملية تُعتبر مُزدوجة الفائدة لإمكانية الحصول على طبقتَين في عملية واحدة. إذ تجمع المادّة غير الذائبة في هيئة بقايا راسبة Residue على ورقة الترشيح، ويتمّ جمع السائل في هيئة رُشاحَة Filtrate. ويمكن أيضًا تسريع عملية الترشيح باستخدام مضخّة شفط، تشفط السائل عبر ورقة الترشيح في قمع بخنر ودورق (الشكل ١-١٠ (ب)). تتنوَّع الطرائق التي تُستخدم للترشيح في الصناعة. ويعد استخدام المُرشِّحات الرملية لمُعالجة المياه وجعلها صالحة للاستخدامات المنزلية من أكثر الطرائق فائدة وفاعلية.

فصل مخاليط المواد الصلبة

تعتمد عملية فصل مادة صُلبة عن مخلوط مواد صُلبة على خصائص المادّة الصلبة المُراد تنقيتها. فمن الضروري وجود اختلاف في إحدى الخصائص الفيزيائية. فقد تعتمد عمليات الفصل على اختلافات في الكثافة، أو على الخصائص المغناطيسية (فصل المواد الحديدية عن مواد فلزّية أخرى في ساحة الخردة، مثلاً). وفي المُختبر، يكون من المُفيد والضروري عادة طحن المخلوط وتحويله إلى مسحوق قبل البدء بأي محاولة للفصل. وتعتمد أكثر الطرائق أهمّية لفصل هذا النوع من المخاليط اعتمادًا كبيرًا على الاختلاف في الذوبانية.

عمليات الفصل التي تعتمد على الاختلاف في الذوبانية

توجد طريقة فعّالة ومفيدة لفصل مادّة صُلبة قابلة للذوبان عن مخلوط من مواد صلبة، وهذه خطواتها: أولًا يُطحن المخلوط ويُحوّل إلى مسحوق، ثم يضاف مذيب سائل مُناسب. فيُذيب مادة واحدة من المواد الصلبة الموجودة في المخلوط، دون المواد الأخرى. وغالبًا ما يكون الماء هو المذيب. لكن سوائل أخرى قد تكون مفيدة أيضًا. بعد ذلك يتم تسخين المُذيب مع المخلوط وتحريكه. ومن ثمّ ترشيح المخلوط الساخن (الشكل ١-١٠). الأمر الذي يؤدّي إلى ترك المواد غير الذائبة على هيئة بقايا على ورقة الترشيح،

حيث يمكن تجفيفها. أما المواد الذائبة، فستكون موجودة في الرُّشاحَة. ويمكن الحصول بعد ذلك على بلورات جافة بواسطة عمليتَى التبخير والتبلور Crystallisation.

0

تذكر تجنَّب استخدام اللهب عندما يكون المُذيب قابلًا للاشتعال. وعوضًا عنه، استخدم جهاز تسخين كهربائيًّا، وحمّامًا زيتيًّا أو مائيًّا.

نشاط ۱-۳

فصل مخلوط ملح الطعام والرمل

المهارات:

يُبين، بطريقة عملية، معرفته بكيفية الاستخدام الأمن
 للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من
 التعليمات المناسبة).

يهدف هذا النشاط إلى فصل مخلوط من ملح الطعام والرمل. تعتمد هذه الطريقة على الاختلاف في ذوبانية المادتين الصَّلبتين وتقنية الترشيح. يجب عليك في نهاية النشاط الحصول على كل من الملح والرمل كمادّتين صُلبتين مُنفصلتَين.

- ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- البس القفازين الواقيين عند الضرورة، أثناء إجراء هذه التجرية.

الطريقة



- ضع مقدار خمس ملاعق من مخلوط الملح والرمل في
 كأس زجاجية. وأضف إلى المخلوط ML 50 من الماء
 المُقطر.
- ضع الكأس على الحامل ثلاثي الأرجل فوق الشبكة المعدنية. سخِّن المزيج برفق مع التحريك باستخدام الساق الزجاجية.
- وقف التسخين عندما يُصبح المحلول على وشك الغليان. أطفئ موقد بنزن. واستمرَّ في التحريك لمدة دقيقة واحدة، ثم اترك محتويات الكأس لتبرد.

- اطو ورقة الترشيح وضعها في قمع الترشيح، فوق الدورق المخروطي كما هو مُبيّن في الرسم التخطيطي.
- عندما تبرد الكأس التي تحتوي على المخلوط،
 قم بترشيح المخلوط، واجمع الرشاحة في الدورق المخروطي.
- أزل قمع الترشيح وضعه على الدورق المخروطي
 الآخر.

للحصول على رمل جاف ونظيف:

- اغسل الرمل الموجود على الورقة في قمع الترشيح
 بالماء المُقطر.
- ضع ورقة الترشيح وعليها الرمل بشكل مفتوح على منديل ورقي حتى تجفّ.

للحصول على بلورات الملح:

- اسكب الرشاحة في حوض التبخير وسخنها بشدّة. استمرَّ في التسخين حتى يتبخَّر معظم الماء (حوالي ثلثي الكمّية). انتبه: لا تسخّن بشدّة كبيرة كي لا «يفيض» السائل من حوض التبخير.
- ر. أوقفِ التسخين ودع المحلول المُركَّز يبرد ببطء حتى تتشكُل بلورات الملح.
 - ال رشِّح البلورات وجفَّفها بوضعها بين ورقتَى ترشيح.


أسئلة

- ا ما الاسم الكيميائي لملح الطعام؟
- آ يمكن لأملاح أخرى، مثل كبريتات الماغنيسيوم أن توجد كشوائب في ملح الطعام. هل تعتبر طريقة الفصل المُستخدَمة هنا كفيلة بإزالة هذا النوع من الشوائب؟ فسِّر إجابتك.
- ۳ ما الطريقة التي يمكنك استخدامها لمعرفة إن كانت عينة الملح التي تملكها نقية أم لا؟

فصل المحاليل

غالبًا ما يكون فصل هذا النوع من المخاليط مُعقّدًا بعض الشيء؛ لعدم وجود طرائق فصل فيزيائية مباشرة، خصوصًا وأن المخلوط الأصلى مُتجانس تمامًا. وتعتمد طرائق الفصل عادة على خصائص الذوبانية، أو على الاختلاف في درجات الغليان (أو التطاير).


يمكن إجراء عملية فصل مادة صلبة عن محلول سائل باستخدام عملية التبخير، أو التبلُور. ينتج عن عملية التبخير مسحوق فقط. في حين ينتج عن عملية التبلُّور بلُّورات جيدة. تبدأ كلتا العمليتين بتبخير السائل. ولكن إذا كنا نريد الحصول على بلورات، يتم إيقاف عملية التبخّر عندما يصبح المحلول مُركّزًا بشكل كاف. أثناء عملية التبخير نغمس ساقًا زجاجية داخل المحلول من وقت إلى آخر. عندما نلاحظ تكوُّن بلُّورات صغيرة على الساقَ الزجاجية نطفئ الموقد ونبعد المحلول عن الحمّام المائي ونضعه جانبًا كي يبرد ببطء. ثم تُفصَل البلّورات المتكوِّنة بواسطة الترشيح، وأخيرًا تُجفّف. يبيّن الشكل (١١-١) كيف يمكن إجراء هذه الطريقة بشكل آمن.



الشكل ١-١١ طريقة التبلور


لكن إذا أردنا الحصول على السائل فيجب استخدام عملية التقطير Distillation، التي تعتمد على أن درجة غليان السائل التي تكون في العادة أدنى بكثير من درجة غليان المادّة الصلبة الذائبة؛ ويكون السائل، بالتالي، أكثر تطايُرًا

من المادّة الصلبة الذائبة، فيتبخّر بكل سهولة في دورق التقطير، ويتكثّف خلال مروره عبر مُكثّف مُبرَّد بالماء، ثم يتم جمعه كسائل مُقطَّر Distillate (الشكل ١٦-١).



الشكل ١٦-١ عملية تقطير مياه البحر

وتعتمد عملية فصل محلول من سائلين ممتزجَيْن معًا (أو أكثر) على تبايُن درجات غليان تلك السوائل. إلا أن درجات الغليان في هذه الحالة تكون أكثر تقاربًا من الحالة السابقة، التي يتكوَّن فيها المحلول من مادة صُلبة ذائبة في سائل، ولهذا يجب استخدام عملية التقطير التجزيئي Fractional distillation (الشكل ۱–۱۳). ففي هذه العملية، يغلى السائل الأكثر تطايُرًا ويتقطّر من المخلوط أولًا. أما السائل الأقلّ تطايرًا فإنه يغلى أخيرًا.



الشكل ١٣-١ عملية فصل مخلوط مُكوَّن من الإيثانول (كحول) والماء باستخدام عملية التقطير التجزيئي

فمثلًا يغلى الإيثانول، عند درجة حرارة ℃ 78، في حين يغلى الماء عند درجة حرارة ℃ 100. وعندما يتم تسخين مخلوط مُكوَّن من هذَين السائلين، تدخل أبخرة الإيثانول والماء إلى عمود التجزئة Fractionating column، حيث يوفّر الخرز الزجاجي الموجود في العمود مساحة سطحية كبيرة لعملية التكثّف. وتحدث عمليتا التبخّر والتكثّف عدّة مرات مع تصاعُد الأبخرة عبر العمود. ويمرّ الإيثانول عبر المُكتَف أولًا عندما تتجاوز درجة حرارة العمود درجة غليانه. أما الماء فإنه يتكثَّف في العمود ويتدفُّق عائدًا إلى الدورق؛ لأن درجة حرارة العمود أدنى من درجة غليانه ℃ 100.

ترتفع درجة الحرارة على ميزان الحرارة عندما يرتفع البخار الساخن ويصل إلى أعلى العمود. بمجرد وصول درجة الحرارة إلى ℃ 78، يبدأ الإيثانول الذي يتبخّر بالتكثُّف ويتدفق إلى أسفل المُكثِّف ليتم جمعه، وبينما يحدث هذا، تظل درجة الحرارة عند ℃ 78، وهي نقطة غليان الإيثانول. بمجرد تقطير كل الإيثانول، ترتفع درجة الحرارة إلى ℃ 100، حيث يتبخّر الماء ويرتفع بخاره إلى أعلى العمود. عند ℃ 100، تظل درجة الحرارة ثابتة مرة أخرى حيث يبدأ بخار الماء في بالتكثُّف، فيتمّ تقطير الماء. ومن خلال مراقبة درجة الحرارة بعناية، يمكن جمع كل من السائلين (الجزءين المُكوِّنين Fractions) بشكل منفصل عن الآخر.

تُستخدم عملية التقطير التجزيئي Fractional distillation نفصل مُكوِّنات أي محلول يحتوي على سوائل لها درجات غليان مختلفة. فالسائل ذو درجة الغليان الأدنى (الأكثر تطايُرًا) في المخلوط يتقطّر أولًا، أما السائل الذي يتم تقطيره في النهاية فهو ذو درجة الغليان الأعلى (الأقلّ تطايُرًا). ويمكن تكييف عملية التقطير التجزيئي بهدف استمراريتها، وهي تُستخدم

مُكوّنات النفط المختلفة.

صناعيًا لفصل:

■ الغازات المختلفة من الهواء المسال.

نشاط ۱-٤ (إثرائي)



رم تقطيرالمخاليط را

المهارات:

- يُبيّن، بطريقة عملية، معرفته بكيفية الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتّباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - ينجز التجرية ويُسجِّل الملاحظات، والقياسات والتقديرات.

في هذه التجربة، سيتم فصل عدّة مخاليط باستخدام أنواع مختلفة من أجهزة التقطير، بما فيها جهاز التقطير المجهري.

يمكن فصل مادتين مختلفتين (مواد صلبة و/أو سائلة) أو عدّة مواد موجودة في محلول باستخدام الكروماتوجرافيا (الاستشراب) Chromatography. ورغم أن هناك أنواعًا عديدة من الكروماتوجرافيا، فإنها جميعها تتَّبع المبادئ الأساسية نفسها. ويمكن أن تكون كروماتوجرافيا الورق الشكل الأبسط الذي يمكن إعداده، وهو مفيد جدًا وفعّال، إذا أردنا تحليل المواد الموجودة في محلول ما. تستطيع الكروماتوجرافيا مثلاً، أن تكشف لنا إن كان المحلول مُلوِّثًا أو لا. وهذه مسألة في غاية الأهمّية؛ لأن تلوُّث الغذاء ومياه الشرب، مثلاً يشكِّل خطرًا على صحّتنا.

توضع عادة نقطة (بقعة صغيرة) من محلول مُركّز للمواد المُراد فصل مكوِّناتها على خط مرسوم بقلم رصاص قريبًا من الحافة السفلية لورقة الكروماتوجرافيا. تُغمس بعد ذلك الحافة السفلية للورقة في المُذيب. ويجب الانتباء إلى أن يكون مُستوى المذيب أدنى من خط وضع العيّنة. يُبيِّن الشكل (١٤-١) كيفية إجراء هذه العملية، ويمكن تكرار تقنية الفصل والتحليل هذه أكثر من مرة، ويمكن استخدام الورقة الواحدة نفسها لتحليل أكثر من عينة في الوقت نفسه.




المرحلة 1

- توضّع نقطة صغيرة من المحلول، ثم تترك لتجفّ.
- يتم تعريف هذه النقطة الأصلية بالرمز (A).
- توضع ورقة الكروماتوجرافياً في المُذّيب.
 - ويبدأ المُذيب بالتحرّك نحو الأعلى عبر الورقة بواسطة الخاصّية الشعرية.



لمرحلة 2

• يتحرِّك المُذيب نحو الأعلى عبر الورقة، حاملاً معه المكوِّنات المختلفة على طول الورقة وبسرعات مختلفة. • تزال الورقة قبل وصول المُذيب إلى الطرف الأعلى من الورقة.



المرحلة 3

• تكتمل عملية فصل المخلوط. • تتوزّع المُكوِّنات المختلفة بشكل متسلسل على طول الورقة، بشكل يشبه العدَّائين في سباق الجري.

الشكل ١-١٤ المراحل المختلفة لإجراء كروماتوجرافيا الورق، حيث يتم فصل مُكوّنات العيّنة أثناء تحرّكها نحو أعلى الورقة

تُعد كروماتوجرافيا الورق طريقة جيدة لفصل المواد المُلوَّنة المخلوطة معًا في محلول. أثناء الكروماتوجرافيا تمتص الورقة المُذيب الذي يتحرّك نحو الأعلى فوق بقعة المخلوط؛ فتتحرّك المواد المختلفة نحو الأعلى أيضًا. وتتحرّك المواد بسرعات مختلفة فتقطع مسافات مختلفة وفقًا لطبيعة تلك

المواد، وطبيعة المُذيب. تسمح لنا هذه التقنية بمقارنة مادة غير معروفة بأخرى معروفة. فإذا قطعت مادتان المسافة نفسها خلال التجربة نفسها، فهناك احتمال أن تكونا من المادة نفسها.

نشاط ۱-٥

استقصاء مُلوِّنات الطعام بواسطة الكروماتوجرافيا

المهارات:

- يُبين، بطريقة عملية، معرفته بكيفية الاستخدام الأمن
 للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من
 التعليمات المناسبة).
 - يُخطط للتجارب ولعمليات الاستقصاء.
 - ينجز التجربة ويُسجّل الملاحظات، والقياسات والتقديرات.
 - يناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويُقيّمها.
 - يقيم الطرائق، ويقترح التحسينات المُحتَملة.

تتضمَّن هذه التجربة فحص بعض مُلوِّنات الطعام باستخدام كروماتوجرافيا الورق؛ والهدف منها الكشف عن هذه الملوِّنات إن كانت نقية أو أنها مخلوط من عدِّة صبغات. ذلك أن مُلوِّنات الطعام هذه تُستخدم في صنع أطعمة، مثل الكعك؛ وقد سُمح باستخدام مجموعة واسعة من هذه المُلوِّنات وهي متوفرة بسهولة. بعض هذه المُلوِّنات تحتوى

على:


- أصفر غروب الشمس (E110)
 - تارترازین (E102) أصفر
 - قرمزي (E120) أحمر
 - إيريثروزين(E127) زهري
 - أزرق لامع (E133)

في هذه التجربة، ستستخدم صبغة صفراء تُسمّى التارترازين مع ثلاثة مُلوِّنات أُخرى. لذلك ستكون قادرًا على معرفة إن كانت المُلوِّنات الثلاثة الأخرى تحتوي على التارترازين. وهذه مسألة مهمّة لأن بعض الناس يظهرون حساسية تجاه التارترازين وعليهم تجنَّبها. ويمكن أيضًا استخدام الطريقة نفسها لدراسة مخاليط وصبغات أخرى.

- 🔥 ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- البس القفازين الواقيين عند الضرورة، أثناء إجراء هذه التجرية.

نشاط ۱-٥

الطريقة



- خذ قطعة من ورق الكروماتوجرافيا. ارسم خطًا
 بقلم رصاص يبعد 1 cm من الحافة السفلية لورقة
 الكروماتوجرافيا، وضع أربع علامات تقاطع أو x على
 الخطّ كما هو مبيَّن، وارمز إلى كل صبغة برمز مُعيَّن.
- Y ضع نقطةً من عينة التارترازين وارمز إليها بالرمز A ثم ضع نقطًا صغيرة من الملوّنات على العلامات التي وضعتها، مستخدمًا أنابيب زجاجية شعرية. استخدم أنبوبة شعرية جديدة لكل عينة، ولا تسمح للنقط بأن تتشر كثيرًا.
 - ٣ دع النقط لتجف.
 - ثبت ورقة الكروماتوجرافيا حول الساق الزجاجية بوساطة مشابك الورق، بحيث يلامس طرف الورقة فقط قعر الكأس عندما تضع الساق الزجاجية عند أعلى الكأس، كما هو مبيّن.
 - أخرج الورقة وأضف الماء إلى الكأس بارتفاع حوالي
 (0.5 cm).

- علِّق ورقة الكروماتوجرافيا في الكأس حتى تُغمَس في الماء، شرط أن تبقى النقط الملوّنة فوق مستوى الماء.
- ۲ دع الماء يتحرَّك نحو الأعلى على طول الورقة، حتى يصل تقريبًا إلى طرفها الأعلى (مباشرة عند أسفل مشابك الورق).
- أخرج الورقة وحدِّد (بقلم رصاص) خطِّ وصول الماء، ثم
 علِّ الورقة حتى تجف.
 - عندما تجّف الورقة قس المسافة التي قطعتها النقط المختلفة، وتلك التي قطعتها جبهة المُذيب.
 - كرِّر التجربة باستخدام مُذيبات مختلفة كالإيثانول أو مخلوط الإيثانول/الماء

النتائج

- ١ سجِّل مُشاهداتك.
- ٢ ارسم ورقة الكروماتوجرافيا الناتجة.
- ٣ اكتب تعليقًا على تركيب مُلوِّنات الطعام التي درستها.
 - الكروماتوجرافيا، وقيم R؛
 - احسب قيم R_f لبعض النقط.
 - ٦ أعدُّ جدولًا لعرض النتائج.

أسئلة

- ١ لماذا يجب رسم الخط أسفل الورقة بقلم رصاص؟
- ماذا سيحدث إذا تجاوز مُستوى المُذيب أعلى مُستوى
 النقط منذ بداية العملية؟
- لماذا يجب ألّا يُترك المُذيب يصل إلى الطرف العلوي للورقة؟

يُستخدم الكثير من المُذيبات المختلفة في الكروماتوجرافيا، مثل الماء، والمُذيبات العضوية (مُذيبات تحتوي على الكربون) مثل الإيثانول، ومحلول حمض الإيثانويك، والبروبانون (الأسيتون). وتعدّ المُذيبات العضوية مُفيدة وفعّالة؛ لأنها تُذيب الكثير من المواد التي لا تذوب عادة في الماء. وعند استخدام مُذيب عضوي، يجب استخدام حوض زجاجي بغطاء، لتفادي تبخُّر المذيب العضوي.

وتتم عملية فصل المواد بحسب قابليتها للذوبان في المُذيب. فعندما يتحرَّك المذيب نحو الأعلى على طول الورقة، تتحرَّك المواد وتبدأ بالانفصال. فالمواد الأكثر ذوبانًا تتحرَّك أسرع نحو الأعلى على طول الورقة، أما المادة غير الذائبة فسوف تبقى عند نقطة الأصل. ويتم إيقاف عملية حركة المذيب مباشرة قبل أن تصل جبهة المذيب المذيب أعلى قمّة الورقة.

وتقاس المسافة التي قطعتها نقطة مُحدّدة، ثم تُقارن بالمسافة التي قطعتها جبهة المُذيب، وتسمّى نسبة هاتين المسافتين مُعامِل التأخر أو قيمة Value R_f، وتُستخدم هذه القيمة لتحديد هوية المادّة:


$$R_{\rm f} = \frac{1}{1}$$
 المسافة التي قطعتها المادّة = $\frac{x}{y}$

كانت كروماتوجرافيا الورق في الأصل تُستخدم لفصل محاليل المواد الملوّنة (الصبغات والمُلوِّنات)، والتي كان يمكن رؤيتها عندما تتحرَّك نحو الأعلى على طول الورقة.

ومع ذلك، فقد زادت فائدة الكروماتوجرافيا كثيرًا باستخدام عوامل تحديد الموقع Locating agents (الشكل ١٥-١)؛

حيث أصبح ممكنًا استخدام الكروماتوجرافيا أيضًا لفصل وتحديد هوية المواد غير المُلونة، إذ تتم معالجة الورقة بعامل تحديد الموقع بعد إجراء عملية الكروماتوجرافيا، فيتفاعل هذا العامل مع العينات لإنتاج بقع مُلوَّنة.

وقد أثبتت الكروماتوجرافيا فائدتها وفاعليتها في تحليل الجُزيئات ذات الأهمية البيولوجية، مثل السكّريات، والأحماض الأمينية، والقواعد النيوكليوتيدية. ونستطيع، أحيانًا، أن نرى جُزيئات بعض الموادّ، كالأحماض الأمينية، عندما توضع ورقة الكروماتوجرام Chromatogram تحت مصباح للأشعّة فوق البنفسجية.



الشكل ١-٥١ كروماتوجرافيا تستخدم عامل تحديد الموقع لكشف مواقع البقع على الورقة. يمكن رش عامل تحديد الموقع على الورقة بشكل مباشر

أسئلة

۱-۹ كيف تتمكَّن من فصل:

أ. الماء عن مياه البحر؟

ب. الإيثانول عن مخلوط من إيثانول وماء؟

ج. بلورات السكّر عن محلول السكّر؟

۱۰-۱ ما نوع المواد التي صُمِّمت الكروماتوجرافيا لفصلها؟


1-1 كيف يمكننا الآن التوسُّع في استخدام الكروماتوجرافيا لفصل المواد غير الملوَّنة؟

11-1 عرِّف مصطلح قيمة R المُتعلِّق بالكروماتوجرافيا.

معالجة المياه

يتكوَّن الماء النقي من جُزيئات الماء فقط، ويتم تحضيره بتقطير المياه العادية. ففي عملية التقطير، يتم غلي الماء الذي يتحوَّل إلى ماء نقي. غير أن هذه العملية مُكلفة ولا تُستخدَم عادة للحصول على ماء الشرب.

ونحن نستخدم كلمة «نقي» في حياتنا اليومية، لوصف كل مادة لم تتمّ إضافة أي شيء إليها. لذلك تعدّ المياه المُعبأة في عبوات، ومياه الصنابير، نقية في لغتنا اليومية. أما العلماء فيرون أن تلك المياه محاليل تحوي الماء (النقي) فيها كمُذيب، بالإضافة إلى مواد أخرى غير جُزيئات الماء.



ومع أن المياه ضرورية للحياة، إلا أنها قد تحمل كثيرًا من الأمراض وتنقلها. فالمياه المُلوّثة تقتل ملايين البشر سنويًا. لذا لا بُدّ من مُعالجة مياه الشرب لكي تكون آمنة للاستخدام. والأهم من ذلك هو مُعالجة المياه المُلوَّثة (مثل مياه الصرف الصحى).

تحتوي مياه الأنهار والبُحيرات والمياه الجوفية على أملاح ذائبة، وحُبيبات صغيرة وصلبة، وبكتيريا. وقد صمِّمت عملية تتقية المياه لإزالة الحُبيبات الصلبة والبكتيريا. وذلك عن طريق ترشيح المياه لإزالة الحُبيبات الصلبة، وإضافة الكلور إلى المياه لقتل أي بكتيريا يمكن أن تُسبِّب الأمراض. يُبيِّن الشكل (١٦-١) عملية حديثة لمعالجة المياه. وهي تختلف عن عملية المعالجة البسيطة في استخدامها الأوزون لإزالة المُبيدات الحشرية وبعض المواد الأخرى الذائبة، والتي يُمكن أن تُسبِّب مشكلات صحية. ومع ذلك فإن الماء لا يصبح نقيًا تمامًا، بل تظل به بعض المواد الصلبة الذائبة، التي قد يكون بعضها مفيدًا للصحة، مثل أملاح الكالسيوم، وبعضها الآخر مُضرًا بها، مثل الأسمدة النيتروجينية.

تقوم بعض دول العالم، بتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، عبر تحليتها Desalination (إزالة ملوحتها). وتجري هذه العملية باستخدام التقطير، أو بتمرير المياه عبر أغشية خاصة باستخدام ضغط مُرتفع (التناضح

العكسي). وتتسم عملية تحلية المياه بالأهمية خصوصًا في سلطنة عمان لعدم وفرة المياه العذبة.

ولا تقتصر حاجتنا للمياه على الاستخدام المنزلي، كما هو مُبيّن في الشكل (١-١٧)، بل تتعدّاه إلى الصناعة والزراعة، حيث تُستخدَم المياه بكمّيات كبيرة. ففي الصناعة، يُستخدَم معظمها كمذيب لمواد أخرى، أو لتبريد التفاعلات الكيميائية (بهدف إبطائها أو إيقافها)، أو لنقل الحرارة من جزء من المصنع إلى جزء آخر. أما الزراعة فتحتاج إلى كمّيات كبيرة من المياه لري المزروعات وخاصة في المناطق ذات المُناخ الجاف، كما هو مُبيَّن في الجدول ((-7)).



الشكل ١٧-١ متوسِّط الاستهلاك اليومي من المياه في الاستخدامات المنزلية للشخص الواحد في إحدى الدول

الاستخدام الكلّي للمياه	استخدام المياه
83%	زراعة
7%	صناعة
10%	استهلاك شخصي

الجدول ١-٣ الاستخدامات الرئيسية للمياه في سلطنة عمان. تستهلك الزراعة مياهًا أكثر بكثير من الاستخدامات الأخرى مُحتمعة

أسئلة

١-١٠ لماذا يتمّ ترشيح المياه قبل عمليات المعالجة الأخرى؟

- ١٤-١ لماذا يُضاف الكلور إلى المياه؟
- ١-١٥ لماذا تُعدّ عملية تقطير مياه البحر طريقة مُكلفة للحصول على مياه الشرب؟

نشاط ۱-۲

المواد الكيميائية في مياه البحر

المهارات:

- يُبيّن معرفته بكيفية الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتّباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - يُنجز التجربة ويُسجِّل الملاحظات، والقياسات والتقديرات.
 - يُفسِّر الملاحظات التجريبية والبيانات، ويُقيّمها.




- ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- البس القفّازين الواقيين عند الضرورة، أثناء إجراء هذه التجرية.
 - توخُّ الحيطة والحذر في أثناء التعامُل مع الأدوات والمحاليل الساخنة.

يتكوُّن البحر بشكل رئيسي من الماء، ولكنه يحتوي على الكثير من المواد الأخرى أيضًا. ويُعدّ كلوريد الصوديوم، أو ملح الطعام، المادّة الأكثر شيوعًا في مياه البحر. وهو يحتوى على مواد أخرى، مثل كلوريد الماغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم وكبريتات الماغنيسيوم، وكمّيات ضئيلة من أيونات الفلزّات، مثل النحاس والحديد.



تم تصميم هذه التجربة لتوضيح أن ماء البحر يحتوى على مخلوط من أملاح مختلفة.

الطريقة



- ا ضع (200 mL) من ماء البحر في كأس زجاجية سعتها .(250 mL)
 - ٧ سخن الماء حتى يبلغ درجة الغليان.
- 🔭 أوقف التسخين عندما يبقى حوالي (60-70 mL) من السائل. خلال عملية التبخّر هذه، ستترسَّب مواد
- ٤ دع الكأس تبرد لكي تترسّب أي مواد صلبة في قعرها.
 - ٥ اسكب السائل الصافي في كأس زجاجية سعتها (100 mL)، تاركًا المواد الصلبة في الكأس الأولى.
- ٦ أضف بضع نقاط من حمض الهيدروكلوريك المُخفّف إلى المواد الصلبة التي بقيت في الكأس الأولى، ولاحظ ما يحدث.
- V ضع الكأس الزجاجية ذات سعة (100 mL) على الحامل الثلاثي والشبك المعدني، ثم سخِّن السائل حتى تظهر مواد صُلبة أخرى، وهو ما سيحدث عندما يبقى حوالى (40 mL) من السائل.

نشاط ۱-۲

- ٨ رشّع السائل بعناية في دورق مخروطي.
- اغسل الكأس الزجاجية ذات سعة (100 mL)، واسكب فيها السائل المرشَّح.
- ١٠ اغل السائل مرّة أخرى حتى لا يبقى فيه شيء تقريبًا.
 - ١١ دعه يبرد، ثم سجِّل ما تلاحظه.

أسئلة

- ما الدليل على أن ماء البحر محلول يحوي مخلوطًا من
 الأملاح؟
- ما الغاز الذي يمكن أن يكون قد انطلق عند إضافة
 حمض الهيدروكلوريك إلى المواد الصلبة التي تم
 جمعها أولًا؟
- علام تدلَّ طبيعة هذا الغاز بخصوص هوية تلك المواد الصلبة؟
- ابحث في الإنترنت عن معلومات حول ذوبانية كلوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم في الماء، (وهما مُركَّبان شائعان موجودان في مياه البحر). استخدم هذه المعلومات لتوقُّع الهوية المُحتملة للمادة الصلبة النهائية التى بقيت عند انتهاء تجربتك.

ملدِّص


ما يجب أن تعرفه:

- هناك ثلاث حالات فيزيائية مختلفة يمكن أن توجد عليها المادة.
- يمكن أن تحدث التغيُّرات في حالة المادة بتغيُّر ظروف
 درجة الحرارة، أو الضغط، أو كليهما معًا.
- يصف النموذج الجسيمي الحركي فكرة أن جُسيمات المادة تكون في حركة مُستمرّة، وأن طبيعة حركة تلك الجُسيمات وكمّيتها تختلفان في المادة الصلبة عمّا هما في السائل أو في الغاز.
- التغيُّر في الحالة الفيزيائية يتضمّن امتصاصًا للطاقة أو تحريرًا لها، وأن درجة حرارة المادة تبقى ثابتة أثناء حدوث هذا التغيُّر.


- المواد النقية تملك درجات انصهار وغليان دقيقة، حيث تؤخذ دقّة تلك الدرجات كدليل على درجة نقاوة المادة.
- يمكن استخدام طرائق الفصل المختلفة، مثل الترشيح،
 والتقطير، والكروماتوجرافيا، لتنقية مادة من مخلوط.
- وجود مشكلة رئيسية في بعض أنحاء العالم من عدم توفُّر
 المياه النقية العذبة.
 - كيفية معالجة المياه لتكون مناسبة للاستخدام المنزلي والصناعي.

أسئلة نهاية الوحدة

ا يُبيِّن الشكل أدناه منحنى التبريد لمادّة ما.




- أ. اكتب الرمز الذي يصف:
- ١. المادة عندما تكون صلبة.
 - ٢. تكثف المادة.
- ٣. المادة عندما تكون غازًا.
 - ب. استنتج درجة غليان المادّة.
- ج. هل هذه المادة نقية أم مخلوط؟ فسِّر إجابتك.
- ۲.2°C تبلغ درجة انصهار البروم ℃ 7.2-، ودرجة غليانه ℃58.8.
- أ. استنتج الحالة الفيزيائية للبروم عند درجة حرارة الغرفة ($^{\circ}$ 25).
- بِ. صف النموذج الجُسَيمي لتوضيح تركيب البروم الموجود في المجمّد، عند درجة حرارة مقدراها ° 18-.
- ج. ما هو التغيُّر في الحالة الفيزيائية للبروم لدى إخراجه من المجمِّد، حيث ترتفع درجة حرارته لتبلغ درجة حرارة الغرفة (°C)؟
 - د. لماذا تم تصنيف التغيُّر في الحالة بأنه تغيُّر فيزيائي؟
 - **هـ.** تمّ وضع البروم السائل في قعر دورق مُغلق، ثم سُخِّن بلطف. فسّر ما يحدث للبروم.
 - ت يمكن استخدام الكروماتوجرافيا لفصل الصبغات الموجودة في مُلوِّنات الأطعمة، ويُبيِّن الشكل أدناه ورقة الكروماتوجرام الناتجة عن أربعة ملوِّنات أطعمة مختلفة.



- أ. اكتب رمز مُلوِّن الطعام الذي يحتوي على صبغة واحدة فقط.
 - ب. اكتب رمز مُلوِّن الطعام الذي يحتوي على ثلاث صبغات.

- ج. اكتب صيغة حساب مُعامل التأخُّر، أو قيمة R,
 - د. احسب قيمة Rf للمادة A.
- ٤ يمكن فصل المخاليط بطرق فيزيائية. اقترح طريقة مُثلى للحصول على كل من:
 - أ. الغازات من الهواء الجوي.
 - ب. بلّورات كلوريد الصوديوم من محلول كلوريد الصوديوم.
 - ج. ماء مقطّر من مياه البحر.
 - د. ملح غير ذائب من محلول.
 - الماء ضروري للحياة.
 - أ. صنِّف الماء النقى: هل هو عنصر أم مُركَّب أم مخلوط؟
- ب. يُبيِّن الشكل أدناه تركيب جهاز التقطير اللازم للحصول على ماء نقي من مياه البحر.



اكتب درجة الحرارة الموجودة على ميزان الحرارة (الثرمومتر).

- ج. استخدم النموذج الجُسيمي لتشرح كيف تختلف مياه البحر عن الماء النقي من حيث تكوين كل منهما.
 - د. اذكُر العمليتين الرئيسيتين المستخدَمتين للحصول على مياه الشرب من مياه البحر.
 - فسِّر اختلاف درجة غليان الماء النقى عن درجة غليان مياه الشرب.



الوحدة الثانية

التركيب الذرّي Atomic Structure

تغطي هذه الوحدة:

- الذرّات والجُزيئات والأيونات
 - العناصر والمُركّبات
- التركيب الذرّي والجُسيمات المُكوِّنة للذرَّة
 - العدد الذرّي والعدد الكُتلي
 - النظائر
 - ترتيب الإلكترونات في الذرّات

١-٢ الذرّات والجُزيئات

العناصر والمُركَّبات

يلخّص الشكل (٢-١) ما نعرفه حتى الآن عن المادّة باستخدام مصطلحات بسيطة. فالعناصر هي «اللبنات البنائية» التي يتكوَّن منها كل شيء في الكون. ويُعرف حاليًا أكثر من 100 عنصر (منها حوالي (94) عنصرًا طبيعيًا، كما سنرى لاحقًا)، يُعتبر عنصرا الهيدروجين (نسبته %92) والهيليوم (نسبته %7)، المكوَّنيَن الأساسيين لكتلة الكون،


في حين تُسهم العناصر الأخرى جميعها بنسبة 1% فقط من المجموع الكلّي لتلك الكُتلة. وجديرٌ بالذكر أن ثمانية عناصر فقط تُشّكل أكثر من 98% من كتلة القشرة الأرضية. فالسيليكون والأكسجين، المُكوِّنان لمادة السيليكات في الصخور، يُشكِّلان تقريبًا ثلاثة أرباع القشرة الأرضية. وبخصوص الكائنات الحيّة فإن بضعة عناصر مُحدَّدة

تُشكِّل المُركَّبات المُعقَّدة الموجودة في الكائن الحي. فعلى سبيل المثال، تتكوَّن كتلة جسم الإنسان من %65 أكسجين، و%18 كربون، و%10 هيدروجين، و%3 نيتروجين، و%5 كالسيوم، و%2.5 عناصر أخرى.

مصطلحات علمية

هناك نوعان من المواد النقية Pure substances، وهما العناصر، والمُركِّبات:

- العُنصر Element: مادّة لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى مواد أبسط منها.
 - الْمُركَّب Compound: مادّة مُكوّنة من عُنصرين، أو عدَّة عناصر، مُترابِطة كيميائيًا.



الشكل ٢-١ خريطة مفاهيم لأنواع المادّة المختلفة


الذرّات والجُزيئات

تتكون بعض العناصر الغازية من جُزيئات، وليس من ذرّات مُنفصِلة. وهذا ينطبق على كل من الهيدروجين (H_2)، والنيتروجين (N_2)، والأكسجين (N_2)، وسواها من العناصر. وقد قدّم العالم دالتون فكرة الجُزيئات لتفسير


الجُسَيمات التي تكوِّن المُركَبات Compounds مثل الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان. حيث تتكوَّن جُزيئات تلك المُركَّبات من ذرَّات عناصر Elements مختلفة مُرتبطة معًا كيميائيًّا، إذ يتكوّن جُزيء الماء من ذرَّتي هيدروجين مرتبطتيَّن بذرّة أكسجين واحدة، وتكون صيغته H₂O. ويتكوَّن الميثان (CH₄) من ذرّة كربون واحدة مرتبطة بأربع ذرّات هيدروجين. ويتكوَّن جُزيء كلوريد الهيدروجين (HCl) من ذرّة هيدروجين وذرّة كلور مُرتبطتين معًا.

تصنيف المادة


يمكن استخدام النموذج الجُسَيمي لتمثيل أنواع مختلفة من المادة. فذرّات العنصر الواحد مُتماثلة تمامًا. ويوجد في الطبيعة 94 عنصرًا بعضها نادر جدّا، جميعها مُدرَجة في الجدول الدوري للعناصر (كما سنرى في الوحدة الثالثة). تتشكّل الجُزيئات من أكثر من ذرّة واحدة، وتكون تلك الذرّات مترابطة بروابط تساهمية. فإذا ارتبطت ذرّات عُنصر واحد لتكوّن الجُزيء، يكون الجُزيء هو العنصر (الشكل ٢-٢).



وعندما يرتبط أكثر من عنصر كيميائيًا فإن المادة المُتكوِّنة تُسمّى مُركبًا (الشكل ٢-٣). وحدها التفاعُلات الكيميائية تستطيع أن تفصل الذرّات الموجودة في مُركَّب.



يحتوي المخلوط على أكثر من مادة واحدة، بحيث لا تكون ذرّات هذه المواد مُترابطة كيميائيًّا (الشكل ٢-٤). ويمكن للمخاليط أن تتكوَّن من عناصر، أو من مركّبات، أو من كلتيهما. ويمكن استخدام تقنيات الفصل الفيزيائية لاستخلاص كل مُكوِّن من مُكوِّنات المخلوط.



الشكل ٢_٤ مثال يُبيِّن مخلوطًا مكوِّنًا من عنصر واحد ومُركّب واحد

التغيرات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية يمكن للمواد الكيميائية أن تختلط معًا بطرائق مُتوِّعة، كما يمكنها أن تتفاعل كيميائيًا. ففي التغيُّر الكيميائي (أو التفاعل الكيميائي ومن الأمثلة على ذلك مُركَّب أن تتحوَّل إلى مادة أخرى. ومن الأمثلة على ذلك مُركَّب كربونات النحاس (اا) الذي يكون صُلبًا أخضر، ولكنه يتغير بالتسخين، ويتحوَّل إلى مسحوق أسود (الصورة ٢-١)، مُنتجًا غاز ثاني أكسيد الكربون. يطلق على هذا النوع من التفاعلات الكيميائية، الذي يتجزّأ خلاله المُركَّب ليشكّل مادّتين أو أكثر اسم التفكيل عادّين أو أكثر اسم التفكيل المحوقة المود (Decomposition).

(II) کربونات النحاس (II) ثاني أکسید الکربون + أکسید النحاس (II)




الصورة ٢-١ تسخين مُركَّب كربونات النحاس (١١)

يحدث تفاعُل التفكُّك أيضًا عن طريق الكهرباء. ذلك أن بعض المواد التي لا توصّل الكهرباء وهي في الحالة الصلبة، تصبح موصّلة للكهرباء عندما تكون على هيئة مصهور أو محلول. ومع مرور التيّار الكهربائي، تتفكُّك تلك المواد إلى مواد أبسط. فمُركَّب بروميد الرصاص (١١) مثلاً هو مسحوق أبيض قابل للانصهار. وعندما يمر تيّار كهربائي عبر مصهوره، يتكوَّن فلز فضّي-رمادي (هو الرصاص)، وغاز بنّي اللون (البروم). وكلتا المادّتين الناتجتَين لا يمكن تجزئتهما (كيميائيًا) إلى مواد أخرى أبسط منهما.

وبخلاف هذا النوع من التفاعل، يُطلُق اسم التكوين أو Formation عندما تتشكّل مادّة نتيجة لاندماج مادتَين أو أكثر. فإذا تمَّ مثلاً إسقاط قطعة من الماغنيسيوم المشتعل داخل أنبوبة زجاجية تحتوي على غاز الأكسجين، تزداد شدة (سطوع) اللهب الأبيض اللامع. وعندما يكتمل تفاعُل الاحتراق، يبقى رماد أبيض اللون (أكسيد الماغنيسيوم). (الصورة ٢-٢).

أكسيد الماغنيسيوم \leftarrow الأكسجين + الماغنيسيوم



الصورة ٢-٢ يُنتج احتراق الماغنيسيوم لهبًا أبيض ساطعًا

في التفاعُل الكيميائي Chemical reaction:

- تتكوّن مادة أو موادّ كيميائية جديدة.
- لا يكون سهلاً إرجاع المادة إلى حالتها الأصلية.
- قد يكون التغيُّر ماصًا للحرارة أو طاردًا للحرارة.

ومن الأمثلة الأخرى على تفاعُلات التكوين تغيُّر مخلوط من مسحوقي الحديد والكبريت، إذ تُطحن المادتان الصلبتان جيدًا ثم تُخلطان معًا، ثم يُسخَّن المخلوط باستخدام موقد بنزن. ويستمرّ مخلوط التفاعُل في التوهّج حتى بعد إزالة موقد بنزن، وهو ما يشير إلى تحرير للطاقة. وبانتهاء التفاعُل تنتج مادة سوداء صلبة لامغناطيسية، هي كبريتيد الحديد (اا)، والتي لا يمكننا إعادة تجزئتها بسهولة إلى حديد وكبريت. ويوضّح هذا المثال بعض الاختلافات المُهمّة بين المخلوط (مسحوق كل من الحديد والكبريت)، والمُركَّب (الناتج النهائي للتفاعل). يُبيّن الجدول (٢-١) الاختلافات العامة بين مخلوط من المواد وتكوين مُركَّب جديد.

عندما يتكون المركّب	عندما يتكوَّن المخلوط
تتفاعل المواد معًا كيميائيًّا	تكون المواد ببساطة
لتشكل مُركّبا جديدًا	ممزوجة معًا؛ ولا يحدث
	تفاعُل بينها
تكون النسب التي تِتّحد بها	يمكن أن تتغيَّر نسب وجود
العناصر في المُركّب هي	المواد في المخلوط
نفسها دائمًا	~
تختلف خصائص المُركّب	لا تتغيَّر خصائص المواد
الجديد عن خصائص	الموجودة فيه
العناصر المُكوِّنة له	
لا يمكن فصل (تفكيك)	يمكن فصل المواد
المُركَّب إلى عناصره	الموجودة في المخلوط
المكوِّنة له بالطرائق	بطرائق فيزيائية، مثل
الفيزيائية البسيطة	الترشيح، أو التقطير، أو
	الجذب المغناطيسي

الجدول ١-٢ الاختلاف بين المخاليط والمُركّبات النقية

تتباين الخصائص المُميِّزة للتغيُّر الكيميائي عن الخصائص التي يتميّز بها التغيُّر الفيزيائي البسيط كالانصهار، أو الذوبان. ففي التغيُّر الفيزيائي Physical change لا تتغيَّر ماهيَّة المواد المعنيّة، ويمكن إعادتها بسهولة إلى حالتها الأصلية باستخدام بعض العمليات الفيزيائية، كالتبريد أو التسخين. فالسكر مثلًا يذوب في الماء،

لكننا نستطيع استعادة بلّورات السكّر مرَّة أخرى عندما نقوم بتبخير الماء. لكن عند حرق السكَّر فإنه يتَّحد مع الأكسجين ويتحوّل إلى مادة جديدة لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، وعندها نقول إن هذا التغيُّر تغيّر كيميائيّ.

أسئلة

١-٢ ما المقصود بالعُنصر؟

۲-۲ ما المقصود بالمُركَّب؟

۲-۲ ترکیب الذرّة

التركيب الذرّي


كيف ترتبط الذرّات معًا لتكوّن الجُزيئات؟ ما الذي يجعل ذرّات معيّنة أكثر استعدادًا للترابط؟ لم ترتبط ذرّات الهيدروجين ثنائيًا، في حين تبقى ذرّات الهيليوم مفردة؟ للإجابة عن أسئلة كهذه، نحن بحاجة للرجوع إلى تركيب الذرّات.

اعتقد العالم دالتون Dalton بأن الذرّة هي جُسيمات صُلبة وغير قابلة للتجزئة. ولكن الأبحاث التي أُجريت بعد ذلك بيّنت أن الذرّات تتكوَّن من جُسيمات دون ذرّية متنوِّعة. فقد اكتشف العالم طومسون Thomson الإلكترون عام (1897م). بعد ذلك اكتشف العالم رذرفورد البروتون عام (1913م) وأُجريت في مختبره مجموعة تجارب بيَّنت أن الذرّة فضاء فارغ، انطلقت منها فرضية رذرفورد بأن الذرّة في معظمها حيز فارغ تشغله وتتحرّك فيه إلكترونات تحمل شحنة موجبة. سالبة، وهي تحيط بنواة صغيرة جدًّا تحمل شحنة موجبة.

وتقع النواة Nucleus في مركز الذرّة، وهي تحتوي تقريبًا على معظم كتلة الذرّة. وبحلول العام (1932م)، مع اكتشاف النيوترون، تبيّن للعلماء أن الذرّات مُكوَّنة من ثلاثة جُسيمات دون ذريّة Sub-atomic particles، هي البروتونات Protons، والإلكترونات Reutrons. وكلُّها والنيوترونات Reutrons، والإلكترونات خميعها مكوّنة منها. ذات طبيعة كونيّة، بمعنى أن الذرّات جميعها مكوّنة منها. وتبقى الذرّة الجُسيْم الأصغر الذي يُظهِر الخصائص المميزة لعُنصر مُحدّد.

قياس حجم الذرّات

تكون الذرّات صغيرة بشكل مُدهِش. ومع ذلك فقد أتاحت لنا الأجهزة البحثية الحديثة، مثل مجهر المسح النفقي (STM)، رؤية ذرّات مُفردة في تركيب كيميائي باستخدام تكبير مقداره 100 مليون مرّة، كما يمكن إظهار نمط التراصّ للذرّات المُكوِّنة لسبيكة ما (مثل الذهب) كما يتضح في الصورة (٢-٣).



الصورة ٢-٣ نمط التراصّ للذرّات المُكوِّنة لسبيكة الذهب

فالذرّة الواحدة صغيرة جدًّا إلى درجة لا يمكن قياس كتلتها على ميزان. ولكن يمكن مقارنة كتلَتَيَ ذرّتين باستخدام مطياف الكتلة Mass spectrometer الذي استُخدِم مطياف الكتلة أحد نظائر عنصر الكربون كمعيار، حيث تتم مُقارنة كتل ذرّات كل العناصر الأخرى بكتلة ذرّة هذا الكربون. وهذه المُقاربة تفضي إلى سلسلة من قيَم الكتلة النزية النسبية Relative atomic mass للعناصر. وقد أعطي نظير الكربون هذا كتلة ذرّية نسبية مقدارها 12.00، وهو يُمثّل كما يأتي: الكربون –12. وهذه الكتلة تساوي 12 مرة كتلة ذرّة الهيدروجين – 1 الذي يعتبر أخف ذرّة على الإطلاق. وتساوي كتلة ذرّة الكالسيوم، 40 مرّة كتلة ذرّة الهيدروجين.

الجُسَيمات دون الذرّية

علمت أن الذرّة في معظمها حيّز فارغ. ولتتمكّن من تصوُّر حجم النواة مقارنة بحجم الذرّة، تخيَّلِ الذرَّة بحجم ملعب كرة قدم، ويكون حجم النواة (في مركز الذرَّة) بحجم حبَّة يازلاء.

تمتلك البروتونات والنيوترونات الكتلة نفسها تقريبًا، في حين أن الإلكترونات لا تكاد تمتلك عمليًا أي كتلة مُقارنةً بكتلة النواة. لذا يمكننا القول إن كتلة الذرّة تتركّز في النواة (تمثل كتلة الإلكترون 1/183 من كتلة البروتون أو 1/1840 من كتلة النيوترون). أما الميزة المُهمّة الأخرى لهذه الجُسيمات، فهي شحنتها الكهربائية، إذ تمتلك البروتونات والإلكترونات شحنات مُتساوية، ولكنها متعاكسة، في حين تكون النيوترونات مُتعادلة كهربائيًا (لا تمتلك أي شحنة). أدرِجت خصائص هذه الجُسَيمات دون الذرّية الثلاثة في البحدول (۲-۲).

الموقع في الذرّة	الشحنة النسبية	الكُتلة النسبية	الجُسيم دون الذرّي
داخل النواة	+1	1	البروتون
داخل النواة	0	1	النيوترون
خارج النواة	-1	1 (ضئيلة) 1836	الإلكترون

الجدول ٢-٢ خصائص الجُسَيمات دون الذرية

نشاط ۲-۱

اكتشاف تركيب الذرّة

المهارات:

 يُعزِّز مهارات البحث: مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

تم اكتشاف طبيعة الجُسَيمات دون الذرّية التي تكوّن الذرّات جميعها ضمن مدَّة زمنية قصيرة نسبيًا من بداية القرن العشرين تقريبًا.


تحقّق من هذه الفترة الزمنية الرئيسية في تاريخ العلوم باستخدام المكتبة ومصادر الإنترنت، ثم ابتكر عرضًا تقديميًّا، أو مُلصقًا يتحدّث عن الاكتشافات المُهمَّة، والعلماء المشاركين، وأهمّهم للبحث: ج.ج. طومسون، وإيرنست رذرفورد، وجيمس شادويك.

أسئلة

- اً ما الذي كان لافتًا للانتباه في تركيب الذرّة المُقترَح بتجارب جايجر مارسدن؟
- ما الشيء المُتعلِّق بطبيعة النيوترون، الذي جعله آخر
 الجُسَيمات المُكتشَفة؟

تكون الذرّة المُفرَدة مُتعادِلة كهربائيًّا (أي إنها لا تملك أي شحنة كهربائية)، وهذا يعني أن أعداد البروتونات والإلكترونات في أي ذرّة يجب أن تكون متساوية. وبمعنى آخر، تكون الشحنة الموجبة الكليَّة للنواة (شحنة البروتونات) مُتعادِلة مع الشحنة السالبة الكلية للإلكترونات التي تدور حول تلك النواة. تعتبر ذرَّة الهيدروجين* الذرَّة الأبسط بين الذرّات الأخرى، لأنها تملك بروتونًا واحدًا وإلكترونا واحدًا، وهي الذرّة الوحيدة التي لا تملك نيوترونات؛ (وهذا يصح فقط في حالة النظير الأول للهيدروجين: النظير الرئيسى).

أما الذرّة الأبسط التالية، فهي ذرّة الهيليوم*، وهي تملك بروتونين ونيوترونين داخل نواتها، وإلكترونين يدوران حول نواتها (الشكل ٢-٥).



تليهما ذرة الليثيوم*، التي تملك ثلاثة بروتونات، وأربعة نيوترونات، وثلاثة إلكترونات. ومع إضافة المزيد من البروتونات والإلكترونات، يصبح التركيب الذرّي أكثر تعقيدًا وسوف يزيد عدد النيوترونات اللازم لكي تبقى النواة مُتماسكة، مع زيادة الحجم الذرّي. وهكذا، فإن ذرّة الذهب* تتكون من 79 بروتونًا (+p)، و118 نيوترونًا (on)،

* هذه ذرّات نظائر للعناصر المذكورة؛ فالنظائر تتباين بعدد النيوترونات في نواها

العدد الذرّي والعدد الكُتَلي

ذكرنا قبل قليل أن ذرّة الهيدروجين هي الذرّة الوحيدة التي تحتوي على بروتون واحد في نواتها. ووحدها ذرَّة الهيليوم تحتوي على بروتونين اثنين في نواتها. وفي المُقابل تتفرّد ذرّة الذهب باحتوائها على 79 بروتونًا. نستنتج من ذلك أن عدد البروتونات الموجودة في نواة أي ذرَّة هو الذي يُحدِّد ماهية العنصر. يُطلَق على هذا العدد المُهمّ اسم العدد النري النري النري ماهية العنصر. ويُرمَز له بـ (Z).

وبالإضافة إلى البروتونات التي تُشكِّل جزءًا من كتلة النواة، تُسهم النيوترونات أيضًا في الكتلة الكلِّية. وبما أن لكل من البروتون والنيوترون الكتلة نفسها (تقريبًا)، فإن كتلة ذرَّة معيَّنة تعتمد على العدد الكُلِّي للبروتونات والنيوترونات الموجودة في نواتها. يُسمِّى هذا العدد العدد الكُتَلي Mass ويُرمَز له بـ (A).

يمكن كتابة العدد الذرّي Z، والعدد الكُتَلي A لذرَّة عُنصر ما إلى جانب رمز ذلك العنصر. وبشكل عام يكون على الشكل الآتي: X_2^A . يكون رمز ذرَّة الليثيوم مثلاً X_3^A . وتكون رموز كلّ من الكربون، والأكسجين، واليورانيوم على التوالي: X_2^A . X_3^A . X_3^A .

وهكذا عندما يكون هذان العددان المُهمّان لأيّ ذرَّة معلومَين، يصبح بالإمكان التعرُّف إلى تركيب تلك الذرَّة من الجُسيمات دون الذرّية.

يُبيِّن الجدول (٢-٣) عدد البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات الموجودة في بعض الذرّات المختلفة.

تذكّر

أن بإمكانك استخدام جدولك الدوري في الامتحان للحصول على معلومات حول الأعداد الذرّية والكُتَلية لأي ذرّة. فالماغنيسيوم مثلًا هو العُنصر الثاني عشر الموجود في الجدول الدوري، لذا يجب أن يكون لدى كل من ذرّاته 12 بروتونًا، و12 إلكترونًا.

خارج النواة	داخل النواة		A (200)	7 200 000	,	77.54
الإلكترونات	النيوترونات (A -Z)	البروتونات (Z)	العدد الكُتُلي، A	العدد الذرّي، Z	الرمز	الذرّة
1	0	1	1	1	Н	الهيدروجين
2	2	2	4	2	He	الهيليوم
3	4	3	7	3	Li	الليثيوم
4	5	4	9	4	Ве	البريليوم
6	6	6	12	6	С	الكربون
8	8	8	16	8	0	الأكسجين
11	12	11	23	11	Na	الصوديوم
20	20	20	40	20	Ca	الكالسيوم
79	118	79	197	79	Au	الذهب
92	146	92	238	92	U	اليورانيوم

ملاحظة. التراكيب التي يظهرها الجدول هي لنظائر معينة للعناصر المذكورة في هذا الجدول.

الجدول ٢-٣ تركيب بعض الذرّات

لاحظ أن القواعد يتم تطبيقها حتى على الذرّات الأكبر والأكثر تعقيدًا والموجودة بشكل طبيعي، أو المُصنّعة بالمختبرات.


النظائر

جاءت قياسات الأعداد الكُتكية لبعض العناصر، التي استُخدم فيها مطياف الكتلة، مُحيِّرة بعض الشيء. فقد تبيَّن أن العيّنات النقيّة لعناصر، مثل الكربون والكلور وسواهما تحتوي على ذرّات لها كُتل مختلفة، مع العلم أنها تحتوي على العدد نفسه من البروتونات والإلكترونات. عُزي سبب الاختلاف في هذه الكُتل إلى الأعداد المختلفة من النيوترونات في نواها. يُطلَق على مثل تلك الذرّات تسمية النظائر Isotopes.

تمتلك نظائر أيّ عنصر كيميائي الخصائص الكيميائية نفسها، لأنها تحتوي على العدد نفسه من الإلكترونات. فعدد الإلكترونات في العنصر هو الذي يحدِّد الطريقة التي تكوِّن بها الذرَّة الروابط، وكيفية تفاعُلها مع الذرّات الأخرى. ومع ذلك فإن بعض الخصائص الفيزيائية للنظائر تكون مختلفة. فمع اختلاف كتُل الذرّات، تختلف كذلك بعض الخصائص الأخرى، مثل الكثافة وسُرعة الانتشار. يُبيِّن مطياف الكتلة الحديث أن معظم العناصر تملك العديد من النظائر المختلفة الموجودة طبيعيًّا. أما بعض النظائر المختلفة الموجودة طبيعيًّا. أما بعض النظائر (الجدول ٢-٤)، فيمكن إنتاجها صناعيًّا.

لدينا المعلومات الآتية:

- العدد الذرّي (Z) = عدد البروتونات الموجودة في النواة
 - العدد الكُتَلي (A) = عدد البروتونات + عدد النيوترونات



المُعادلتان الآتيتان مُفيدتان جدًّا، وهما:

- عدد الإلكترونات = عدد البروتونات = (العدد الذرّى)
 - عدد النيوترونات

(Z) العدد الكُتلي (A) – العدد الذرّي =

يُبيِّن كلِّ من التريتيوم والكربون-14 اختلافًا آخر في الخصائص الفيزيائية التي يمكن أن تحدث بين النظائر، ذلك أنهما نظيران مُشعّان. ويُسهم عدم التوازن بين النيوترونات والبروتونات الموجودة في نواة كل منهما في جعلهما غير مُستقرَّيْن؛ فتنشطر نواتاهما تلقائيًّا (وهذا يتم من دون توفر أي طاقة خارجية)، مُطلقتين أنواعًا مُحدَّدة من الإشعاع. يُسمّى هذا النوع من النظائر بالنظائر المُشعَّة Radioisotopes.

أن اختلاف عدد النيوترونات الموجودة في نوى الذرّات هو سبب الاختلاف بين النظائر، مع أن هذه الذرّات يكون لديها العدد نفسه من البروتونات والإلكترونات.

مصطلحات علمية

النظائر Isotopes: ذرّات للعنصر نفسه، تملك العدد الدرّي نفسه، لكنّها تختلف في العدد الكُتَلي.

أسئلة

- ٣-٢ كم عدد كل من البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات الموجودة في ذرّة الفوسفور، التي يبلغ عددها الذرّي 15، وعددها الكُتلي 31؟
- **٤-٢** ما الكُتل النسبية لكل من والنيوترون والإلكترون، علمًا أن البروتون يملك كتلة تساوى ١؟
 - ٧-٥ ما الفرق بين ذرّة الكلور-35، وذرّة الكلور-37، من
 حيث التركيب دون الذرّی؟

- تملك نظائر العنصر العدد نفسه من البروتونات والإلكترونات، لكنها تملك أعداد نيوترونات مختلفة في نواها.
- تمتلك نظائر العنصر الخصائص الكيميائية نفسها، لأنها تمتلك التركيب الإلكتروني نفسه؛ فإلكترونات مُستوى الطاقة الخارجي هي التي تتحكم بالتغيُّرات الكيميائية.
 - تمتلك نظائر العنصر خصائص فيزيائية مختلفة
 قلىلاً لأن لها كُتلاً مختلفة.
- تكون نوى بعض النظائر غير مستقرّة؛ وهي النظائر
 المُشعّة Radioisotopes، التي تنبعث منها أشكال
 مترّعة من الإشعاع.

النيوترونات	البروتونات	الإلكترونات	النظائر (نسبة وجودها في الطبيعة)	العنصر
0	1	1	هيدروجين ₁ ۱ (%99.9)	الهيدروجين
1	1	1	دیتیریوم ₁ H ((0.01%)	
2	1	1	تريتيوم H ⁰ (أ	
6	6	6	کربون-12 ₆ c (98.9%)	الكريون
7	6	6	کربون-13 ح ₆ 1 (1.1%)	
8	6	6	کربون-14 ^(۱) (قلیل جدًّا)	
10	10	10	نيون-20 Ne 20 ₁₀ (90.48%)	النيون
11	10	10	نيون-21 Ne 21 ₁₀ Ne (0.27%)	
12	10	10	نيون-22 Ne 22% (9.25%)	
18	17	17	كلور-35 ₁₇ CI كلور-35	الكلور
20	17	17	کلور-37 ₁₇ Cl كلور-37	

(١) ذرّات التريتيوم، والكربون-14 هي نظائر مُشعّة؛ لأن نواها غير مُستقرّة.

٣-٢ ترتيب الإلكترونات في الذرّات

يُعدّ الشفق القُطبي (الصورة ٢-٤) عرضًا مدهشًا يُرى في السماء في أقصى شمال الكرة الأرضية (وهناك ظاهرة مُشابهة، وهي الشفق الأسترالي، الذي يحدث في أقصى الجنوب). تحدث هذه الظاهرة بسبب الإشعاع القادم من الشمس، والذي يُحرِّك الإلكترونات في ذرّات الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. يمكن في المختبر إنتاج تأثيرات لونية مشابهة بطريقة بسيطة، وذلك عند تسخين مُركَّبات بعض الفلزّات باستخدام موقد بنزن. ويمكن أيضًا مشاهدة تلك الألوان في عروض الألعاب النارية. فهي تنتج من حركة الإلكترونات الموجودة في الذرَّة، والتي تتنقل بين من حركة الإلكترونات الموجودة في الذرَّة، والتي تتنقل بين مستويات طاقة Energy levels مختلفة.

في العام 1913 م، طوّر العالم نيلز بور، نظرية تُفسِّر كيفية ترتيب الإلكترونات في الذرّات. وقد أسهمت تلك النظرية في تفسير كيفية ظهور الألوان المُشار إليها أعلاه.

يمكن تقديم نسخة مُبسَّطة عن نظرية بور Bohr's theory لترتيب الإلكترونات في الذرَّة على النحو الموجز الآتي (انظر الشكل ٢-٦ أيضًا):

- تتحرَّك الإلكترونات في مدارات حول النواة المركزية للذرَّة.
- تُسمّى مدارات الإلكترونات مُستويات طاقة، وهي تمتلك طاقات مختلفة.
- تمتلك مُستويات الطاقة البعيدة عن النواة طاقات أعلى.
- يتمّ ملء مُستويات الطاقة بالإلكترونات بدءًا بالمُستوى ذي الطاقة الدنيا (الأقرب إلى النواة).
- يمكن لمُستوى الطاقة الأوَّل أن يستوعب إلكترونيَن التَيْن فقط.
- يمكن لمُستوى الطاقة الثاني والمُستويات التي تليه أن تستوعب ثمانية إلكترونات (أو أكثر) لتصل إلى الترتيب المُستقرِّ للإلكترونات (كما في الغازات النبيلة).



الصورة ٢-٤ الشفق القطبي، أو الأضواء الشمالية، كما تُرى من فنلندا

أول أو أدنى مستوى طاقة. مستوى الطاقة الثاني. يمكن وضع إلكترونات فقط في هذا المستوى. في هذا المستوى. النواة التي تتكوّن من البروتونات من البروتونات. من البروتونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات. والنيوترونات.

الشكل ٢-٦ نموذج بور لترتيب الإلكترونات في الذرّة

لقد تمكَّن العلم من توفير أدلَّة تدعم ترتيب الإلكترونات في الذرَّات، ويُبيِّن الجدول ٢-٥ عدد الإلكترونات وترتيبها للعناصر العشرين الأولى في الجدول الدوري.

يوضح الشكل ٢-٧ التركيب الإلكتروني لذرة الكربون التي تُعد من أكثر أنواع الذرّات استخدامًا في الطبيعة. تُعد دراسة ترتيب الإلكترونات في الذرّة أمرًا قيِّمًا ومُفيدًا. فهي تبدأ بتفسير الأنماط في خصائص العناصر، التي تمثّل الأساس في بناء الجدول الدوري. وهو ما ستتم مُناقشته في الوحدة الثالثة.

6 إلكترونات النواة التي تحتوي النواة التي تحتوي على 6 بروتونات على 6 بروتونات و 6 نيوترونات


تذكّر

كيف تُحدِّد التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى، وكيف تُرسم حلقات (مُستويات الطاقة) كما هو مُبيِّن في الشكل (٢-٨). وتذكَّر أيضًا أن بإمكانك إعطاء ترتيب الإلكترونات أو التركيب الإلكتروني بشكل مُبسَّط مُستخدِمًا الأعداد: مثل (4، 8، 2) لذرَّة السيليكون.

الشكل ٧-٧ ذرّة الكربون-12. قد تكون ذرّات عنصر الكربون الأكثر استخدامًا في الطبيعة

التركيب الإلكتروني	المستوى الرابع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	العدد الذرّي Z	الرمز	العناصر
1				•	1	Н	الهيدروجين
2				••	2	He	الهيليوم
2,1			•	••	3	Li	الليثيوم
2,2			••	••	4	Ве	البريليوم
2,3			•••	••	5	В	البورون
2,4			••••	••	6	С	الكربون
2,5			•••••	••	7	N	النيتروجين
2,6			•••••	••	8	0	الأكسجين
2,7			•••••	••	9	F	الفلور
2,8			••••••	••	10	Ne	النيون
2,8,1		•	••••••	••	11	Na	الصوديوم
2,8,2		••	••••••	••	12	Mg	الماغنيسيوم
2,8,3		•••	••••••	••	13	Al	الألومنيوم
2,8,4		••••	••••••	••	14	Si	السيليكون
2,8,5		•••••	••••••	••	15	Р	الفوسفور
2,8,6		•••••	••••••	••	16	S	الكبريت
2,8,7		•••••	••••••	••	17	CI	الكلور
2,8,8		••••••	••••••	••	18	Ar	الأرغون
2,8,8,1	•	••••••	••••••	••	19	К	البوتاسيوم
2,8,8,2	••	••••••	••••••	••	20	Ca	الكالسيوم

الجدول ٢-٥ التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى من الجدول الدوري



الشكل ٢ـ٨ طرائق مختلفة لتوضيح التركيب الإلكتروني

أسئلة

- ٦-٢ ما العدد الأقصى للإلكترونات الذي يمكن أن يملأ مستويي الطاقة الأول والثاني للذرَّة؟
- ٧-٢ اكتب التركيب الإلكتروني لذرَّة الكالسيوم، التي عددها الذرّى يساوى 20.
- ٨-٢ ما عدد الإلكترونات الموجودة في مُستويات الطاقة الخارجية لكل من ذرَّتَي الغازَيْن النبيلينن: الأرغون والنيون؟
- **٩-٢** الكربون–12 والكربون–14 نظيران مختلفان للكربون. ما عدد الإلكترونات الموجودة في ذرَّة كل نظير منهما؟

ملخّص

ما يجب أن تعرفه:

- يمكن أن تكون المواد الكيميائية النقية، إما عناصر وإما مُركَّبات.
- العناصر هي وحدات البناء الأساسية للعالم المادي، ولا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى أي شيء أبسط منها.
- المُركَبات تتكوَّن من عنصرين أو أكثر، وتكون هذه
 العناصر مُترابطة كيميائيًا. وتكون خصائص المُركَّبات
 مختلفة تمامًا عن خصائص العناصر التى تشكَّلت منها.
- کل عنصر یتکون من ذرّات، والذرّات یمکن أن ترتبط معًا لتکوِّن جُزیئات، إما لعنصر وإما لمُركَّب.
 - ذرّات العناصر تتكوّن من جُسيمات دون ذرّية، وهي البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات.
- تمتلك البروتونات والإلكترونات شحنات كهربائية مُتعاكسة، في حين أن النيوترونات لا تمتلك أي شحنة كهربائية.

- توجد البروتونات والنيوترونات معًا في النواة المركزية لأي ذرّة، أما الإلكترونات فتدور حول النواة في مُستويات طاقة مختلفة.
 - عدد البروتونات الموجودة في الذرّة يُعرف بأنه العدد الذرّي (Z) للعنصر.
 - العدد الكُتابي (A) يُعرف بأنه العدد الكلّي للبروتونات والنيوترونات الموجودة في أي ذرّة.
- يمكن أن يكون للعنصر الواحد عدّة نظائر، تختلف فيما بينها فقط في عدد النيوترونات الموجودة في نواها.
- تترتب الإلكترونات الموجودة في الذرّات في مُستويات طاقة مختلفة، وتقع مُستويات الطاقة هذه على مسافات مختلفة من نواة الذرّة.
 - يمكن لمُستوى الطاقة أن يستوعب عددًا محددًا من الإلكترونات، ويبدأ ملء الإلكترونات في المُستويات الأقرب إلى النواة أوّلًا.

أسئلة نهاية الوحدة

١ أكمل الجُمَل الآتية التي تتعلَّق بالتركيب الذرّى مُستخدمًا الكلمات الواردة في القائمة الآتية:

 كتلة ذرّية نسبية
 النواة
 الإلكترونات

 الذرّة هي
 النيوترونات
 الأصغر الذي يمكن أن يوجد بمفرده، ومركز

 الذّرة هي
 على البروتونات و

 تحتوي على البروتونات و
 مقدارها ١٠

 لذلك تكون معظم كتلة الذرّة في
 أمّا

 مدارات حول النواة، تُسمّى مستويات الطاقة.
 الطاقة.

۲ يبيّن الشكل أدناه رموز ثلاثة نظائر لعُنصر الهيدروجين.

 \mathbf{H} ${}_{1}^{2}\mathbf{H}$ ${}_{1}^{3}\mathbf{I}$

هيدروجين-3 هيدروجين-2 هيدروجين-1 (تريتيوم) (ديتيريوم) (بروتيوم)

أ. اكتب عدد البروتونات الموجودة في البروتيوم. ب. اكتب التركيب الإلكتروني للديتيريوم.

ج. صف نواة التريتيوم. د. قارن بين خصائص النظائر الثلاثة للهيدروجين.

🔭 الصوديوم فلزّ يمتلك العدد الذرّي Z = 11، والعدد الكُتَلي A = 23.

أ. اكتب رمز عنصر الصوديوم.
 ب. ما التركيب الإلكتروني لذرة الصوديوم؟

ج. فسِّر لماذا لا تمتلك ذرّة الصوديوم شحنة كهربائية كليّة.

عمثّل الشكل أدناه النظير الأوّل لعنصر النيون.

20 Ne نیون 10

- أ. احسب عدد النيوترونات الموجودة في نواة النيون -20. ب. اكتب التركيب الإلكتروني لعُنصر النيون.
 - ج. النيون عنصر. عرِّف المقصود بمصطلح «العنصر». د. لماذا يعدّ النيون عنصرًا غير نشط؟
- هـ صف تركيب عينة من النيون عند درجة حرارة الغرفة، وحركتها. و قارن مُعدّل انتشار كل من النيون والهيليوم، وفسّر الفرق بينهما.

- تملك ذرّة الهيليوم-5، جُسيمات ذات شحنة في داخلها، هي:
 - بروتونان شحنتهما +2 وإلكترونان شحنتهما -2.
 - أ. ما قيمة الشحنة الكلّية لذرَّة الهيليوم؟
- ب. تملك ذرّة الهيليوم-5، بالإضافة إلى البروتونات والإلكترونات، عددًا من النيوترونات. أين توجد هذه النيوترونات؟ وكم يبلغ عددها؟
- ج. تساوي كُتلة كل من البروتون والنيوترون وحدة (ذرّية) واحدة، والإلكترون لا كُتلة له (تقريبًا). فما قيمة الكُتلة الذرّية النسبية لذرّة الهيليوم-5؟



الوحدة الثالثة

الجدول الدوريّ Periodic Table

تُغطّي هذه الوحدة:

- المجموعات والدورات في الجدول الدوري
- الفلزّات واللافلزّات في الجدول الدوري للعناصر
 - التركيب الإلكتروني والجدول الدوري
 - تدرُّج الصفة الفلزَّية واللافلزَّية

٦-٣ الجدول الدوري للعناصر - تصنيف العناصر

اعتبرت عملية بناء الجدول الدوري Periodic Table الحديث للعناصر إنجازًا علميًّا رئيسيًّا، وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بُذلت لترتيب العناصر وتصنيفها، إلا أن ذلك ظل محدودًا وغير دقيق إلى أن قدّم العالم

الروسي مندليف Mendeleev عام 1869م، وبالاستفادة من المعلومات المتاحة له في ذلك الوقت، نموذجًا للجدول الدوري مُعتمِدًا على الكُتَل الذرّية للعناصر، وقد عُزي نجاح الجدول الدوري لمندليف إلى تركه فراغات لعناصر مُحتمَلة

لم تكن مُكتَشفة بعد (الصورة ٣-١)، ولعدم مُحاولته توزيع العناصر وفق أنماط مُعيَّنة، لأنه لم يكن يمتلك دليلاً يُثبِت ذلك التوزيع.

لقد اعتمد تصميم الجدول الدوري الحديث بنسخته النهائية على أعمال مندليف، حيث أُضيفت لاحقًا مجموعة من العناصر لم تكن مُكتَشفة آنذاك. ورُتِّبت العناصر وفقًا لازدياد أعدادها الذرِّية في صفوف أفقية تُسمّى بالدورات Periods

المجموعات والدورات في الجدول الدوري

يتَّضح من الشكل (٣-١) أن الجدول الدوري يتألَّف من 7 دورات، تتألَّف الدورة الأولى من عُنصرَي الهيدروجين والهيليوم، أما الدورة الثانية فتتكوَّن من ثمانية عناصر تبدأ بالليثيوم وتنتهي بالنيون. ونلاحظ أن العدد الذرِّي للعُنصر يزداد بمقدار 1 عن العنصر الذي يسبقه.

وتم أيضًا تقسيم العناصر في الجدول الدوري إلى 8 مجموعات رئيسية (الشكل ٣-١). فقد رُتِّبت العناصر على شكل مجموعات رئيسية من ا إلى الله بحيث تمتلك عناصر المجموعة الواحدة خصائص كيميائية وفيزيائية مُتشابهة.

تكتسب بعض المجموعات الرئيسية أسماء خاصة. فالمجموعة التي تضمّ أكثر الفلزّات نشاطًا تُسمّى بمجموعة الفلزّات القلوية. أمّا المجموعة اللافلزّات نشاطًا بمجموعة الهالوجينات وتضمّ أكثر اللافلزّات نشاطًا كيميائيًّا. أضف إلى ذلك أن الغازات النبيلة الموجودة في المجموعة اللا تُعدّ عناصر غير نشطة كيميائيًّا.

وتتوسّط الجدول مجموعة من العناصر الفرعية تقع بين المجموعتين ال والله تضم مجموعة من العناصر الفلزّية تُسمّى بالعناصر الانتقالية أو الفلزّات الانتقالية، حيث يبدأ ظهورها في الدورة الرابعة وهي تضم عددًا من الفلزّات المُهمّة كالحديد والنحاس والخارصين.



الصورة ٣-١ تمثال مندليف وجدوله الدوري الأول منحوت على جدار مبنى جامعة بطرسبرج في روسيا

مصطلحات علمية

- الجدول الدوري Periodic table: هو الجدول الذي نُظُمت فيه العناصر الكيميائية وفقًا لزيادة العدد الذرّي والتركيب الإلكتروني.
 - الدورة Period: صفّ في الجدول الدوري يحتوي على عناصر مُرتَّبة وفقًا لتزايُد أعدادها الذرّية.
- المجموعة Group: عمود في الجدول الدوري يحتوي على عناصر لها خصائص كيميائية مُتماثِلة.

ج خود ع ع ج چ = الدورة 1	المفتاح $X = \text{العدد الذري = a}$ $X = \text{الرمز = X}$ $A = Illy only only only only only only only o$	المجموعة ااا	المجموعة \\ المجموعة \	المجموعة الا	Lastrag 2 is The state of t
2 الدورة Li Li Re الدورة 2 بريليوم		5 B بورون 11	6 C N نیتروجین کربون 12	8 9 O F فلور أكسجين 16 19	10 Ne نیون 20
الدورة 3 الدورة 3 الدورة 3 الدورة 3 الدورة 3 الدورة 3		13 Al ألومينيوم 27	14 Si P فوسفور سیلیکون 28	16 17 S Cl کلور کبریت 32 35.5	18 Ar أرغون 40
4 الدورة 4 كالسيوم بوتاسيوم كالسيوم 9	21 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zn كارمين نحاس نيكل كورالت حديد منغنيز كروم فناديوم تيتانيوم سكانليوم كالديوم نوا هي المحالم كوره فناديوم المحالم كوره كوره كوره كوره كوره كوره كوره كوره	31 Ga م غاليوم 70	32 Ge As زرنیخ جیرمانیو، 75	34 35 Se Br بروم سیلینوم 79 80	36 Kr کریبتون 84
37 Rb Sr سترونشيوم روبيديوم 86	39 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd Ag Lg ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم ايتريوم الإديوم	49 In إنديوم 115	50 Sn Sb أنتيمون أنتيمون 119	52 53 Te ا يود تيلوريوم 128 127	54 Xe زينون 131
6 الدورة Cs باريوم سيزيوم 137 الدورة	La to Lu 72	81 TI	82 Pb Bi بيزموث رصاص 207	84 Po At أستاتين بولونيوم -	86 Rn رادون -
88 88 Fr راديوم فرانسيوم -	Ac to Lr	201	207		
	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy 139 140 141 144 - 150 152 157 159 163 89 90 91 92 93 94 95 96 Pm 98 97 98 Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Sllagoriugh Everyal and the properties of the properties	67 Ho ae Leage 165 99 Es Limiliza	68 69 Tm أوريوم أوريو	70 Yb Lu وتشيوم 173 102 No No Lr ورنسيوم التربيوم التربيوم التربيوم التربيوم التربيوم التا ال التا التا التا الاتا التا التا التا التا التا الاتا الاتا التا ال ال التا الاتا التا ال التا الاتا الاتا التا ال التا	
تُعرف العناصر التي تنتمي إلى المجموعات من ا إلى VIII بأنها عناصر المجموعات الرئيسية Main-group elements. الفلزّات النشطة Reactive metals: الفلزّات الفقيرة Poor' metals المجموعة الفلزّات القلوية؛ المجموعة الفلزّات القلوية الترابية الفلزّات القلوية الترابية الفلزّات القلوية الترابية الفلزّات القلوية الترابية المجموعة الفلزّات القلوية الترابية الفلزّات الفلزّات القلوية الترابية الفلزّات الفلزّا					
	أشباه الفلزّات Metalloids؛ وتتضمّن أشباه الغازات النبيلة فة الموصّلات مثل السيليكون والجير مانيوم ذات نشاط شبه			العناصرالا elements: فلزّ	

الشكل ١-١ الجدول الدوري بأجزائه الرئيسية (تُعطى قيم الكُتل الذريّة النسبية للعناصر مقرَّبة إلى أقرب عدد صحيح باستثناء الكلور)


الفلزّات واللافلزّات

يوجد في الطبيعة 94 عنصرًا، بعضها نادر جدًا كالفرانسيوم، الغُنصر الذي لم يُشاهَد من قبل. كما أن بعض الفلزّات المُشعَّة، كالنبتونيوم والبلوتونيوم، والتي يتم إنتاجها صناعيًا بكمّيات كبيرة جدًا، توجد في الطبيعة بكمّيات ضئيلة جدًا. ويمكن تصنيف مُعظم العناصر (70 عُنصرًا) على أنها فلزّات. وهي عبارة عن مجموعة من العناصر ذات تركيب مُتماسِك وتمتلك خصائص فيزيائية مُتماشِلة.

تشغل الفلزّات الجهة اليُسرى والوسطى من الجدول الدوري. وتتَّصف بأنها صُلبة عند درجة حرارة الغرفة (باستثناء الزئبق)، وهي مرنة (قابلة للتشكيل وقابلة


للطرَق والسحُب)، وموصِّلة جيّدة للحرارة وللكهرباء، ولامعة (برّاقة).

يُبيِّن الشكل (٣-٢) النموذج الجُسَيمي لعُنصر فلزّيّ.



الشكل ٣-٢ النموذج الجُسَيمي لعُنصر فلزّي يوضّح تراصّ ذرّات الفلزّ في ترتيب مُنتظِم

أمّا اللافلزّات فتقع في أعلى يمين الجدول الدوري، وهي موادّ عازلة (باستثناء الكربون في شكل جرافيت) وتكون غالبًا ذات درجات انصهار وغليان منخفضة. وتُظهر العناصر اللافلزّية مدى أوسع من الخصائص ما يعكس الاختلافات الكبيرة في أنواع التراكيب البنائية التي تُكوِّنها. يُبيِّن الشكل (٣-٣) النموذج الجُسَيمي لغاز أُحاديّ الذرّة.




الشكل ٣-٣ النموذج الجُسيمي لغاز أحادي الذرَّة (غاز نبيل) وهو عنصر لافلزّي جُسيماته مُتباعِدة

يُتيح الجدول الدوري معرفة موقع كلّ من الفلزّات Non-metals. فنلاحظ وجود خطّ مُتدرِّج واللافلزّات عصل بين الفلزّات واللافلزّات كما يظهر في الشكل (٣-١). وهذا يمثِّل أحد الاستخدامات المُهمّة للجدول الدوري. فحتى لو لم نشاهد مُطلقًا أي عينة من عُنصر الهافنيوم Hf، مثلاً، فإن نظرة سريعة نلقيها على الجدول الدوري تكشف لنا أنه فلزّ، وسنكون أيضًا قادرين على تخمين بعض من خصائصه.

وإذا أمعنت النظر في الشكل (٣-١) تُلاحظ أن مواد كالفولاذ، والبرونز، والنحاس الأصفر (الصَّفر) لم تُدرَج في الجدول الدوري، رُغم أننا نطلق عليها اسم فلزّات في حياتنا اليومية، وتتشارك في خصائصها مع الفلزّات. وسبب ذلك أنها ليست عناصر نقية، بل هي في الحقيقة سبائك (alloys)، تتكوَّن من خليط من عُنصرين فلزّيين أو أكثر تدخل أحيانًا في تركيب السبائك عناصر لافلزية، كالكربون الذي نجده في الصلب والفولاذ)، وغالبًا ما تُصنع لأغراض مُحدَّدة. وتوضَّح الصورة (٣-٢) مجموعة صور لعناصر فلزّية ولافلزية.

يبدو أن الانتقال من الخصائص الفلزّية إلى الخصائص اللافلزّية للعناصر ليس فجائيًا بالشكل الحادّ والقاطع الذي يُظهِره الخطّ المتدرِّج السميك المرسوم بين قسمَي الجدول الدوري. حيث تُظهِر العناصر القريبة من هذا الخط المتدرِّج

عُنصرِ الكربون في شكلين مختلفين: الجرافيت والماس





عُنصر الذهب مضغوط في سبائك



عينة من عنصر الكبريت، تستخدم لصنع حمض الكبريتيك الذي هو أساس العديد من المواد الكيميائية، مثل الأصباغ والمبيدات الحشرية



الصورة ٣-٢ صور لعناصر فلزيّة والفلزّية

خصائص تجمع بين الفلزّات واللافلزّات، وتُعرف تلك العناصر باسم أشباه الفلزّات (Metalloids ، Semi-metals).

يحتوي الجدول الدوري على ثمانية عناصر شبه فلزية، تتميّز بامتلاكها خصائص مُشتركة مع الفلزّات كالصلابة وغير واللمعان، كما تتشابه مع اللافلزّات في أنها هشّة وغير موصّلة للحرارة لكنها تُعدّ من أشباه المُوصِّلات للكهرباء. ويُعتَبر عُنصر السيليكون من أهم أشباه الفلزّات المعروفة في الوقت الراهن. وهو يدخل في صناعة الكثير من الرقائق الإلكترونية التي تُستخدَم في العديد من الصناعات بما في ذلك السّيّارات والبناء والطاقة والإلكترونيات (الصورة عي ذلك الجدول (٣-١) مُقارنة بين الخصائص الفيزيائية للفلزّات واللافلزّات.

الصورة ٣-٣ عيّنة لعُنصر السيليكون، الذي يعدّ المادّة الأساسية لصناعة أشباه المُوصِّلات

اللافلزّات	الفلزّات
صُلبِة Solids أو غازيّة (باستثناء البروم الذي يكون	صُلبة Solids عادة (باستثناء الزئبق الذي يكون سائلًا) عند
سائلًا) عند درجة حرارة الغرفة.	درجة حرارة الغرفة.
درجات انصهارها وغليانها في العادة مُنخفِضة.	درجات انصهارها وغليانها في العادة مُرتفِعة.
معظم اللافلزّات طرية (ليّنة) أكثر من الفلزّات	صلدة وكثيفة في العادة.
(باستثناء الماس فهو صلد جدًا)، وغالبًا ما تكون	
كثافاتها مُنخفِضة.	
رديئة التوصيل للكهرباء (باستثناء الجرافيت، وهو من	موصّلة جيّدة للكهرباء. ^(†)
الأشكال التآصلية للكربون التي ستدرسها لاحقًا)،	
وتميل إلى أن تكون موادّ عازلةً.	
رديئة التوصيل للحرارة بشكل عام.	موصِّلة جيّدة للحرارة.
معظمها هشَّ عندما يكون في الحالة الصلبة.	يمكن تشكيلها بالطرِّق (قابلة للطرْق Malleable).
	ويمكن سحّبها في هيئة أسلاك (قابلة للسحْب Ductile).
ألوانها مختلفة.	لونها رمادي (باستثناء الذهب والنحاس).
غالبًا ما تمتلك سطحًا باهتًا عندما تكون في الحالة	ويمكن صقلُّها (فتُصبِح لمَّاعة).
الصلبة.	,
ليست رنّانة.	يصدر عنها في العادة صوت رنين لدى طرِّقها (أي إنها رنّانة
	(Sonorous

(أ) يُعتَمد التوصيل الكهربائي عادة كأبسط اختبار لتصنيف مادة ما أنها فلزّية أم لا.

الجدول ١-٣ مُقارَنة بين الخصائص الفيزيائية للفلزّات واللافلزّات

نشاط ۲-۱


اختبار الفلزّات واللافلزّات

المهارات

- يُبين بطريقة عملية المعرفة المتعلقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها
 اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - يُخطِّط للتجارب والاستقصاءات.
 - يُنجز التجربة ويُسجّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يُناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويُقيّمها.

يُعدُّ التوصيل الكهربائي الاختبار الرئيسي للتمييز بين الفلزَّات واللافلزَّات. يتم تركيب دائرة كهربائية بسيطة باستخدام مصباح كهربائي أو مقياس شدة التيار الكهربائي (الأميتر). ويتم توفير الطاقة بواسطة بطّاريات. افحص مجموعة من العناصر الصلبة تتضمّن الماغنيسيوم والخارصين والقصدير والحديد والكبريت والجرافيت.

يمكن اختبار أحد العناصر المُثيرة للاهتمام، وهو قلم رصاص ". شُحِد من طرفَيَه. اختبر كلاً من الخشب الخارجي و"الرصاص". ضع جدولًا تظهر فيه النتائج للمواد الموصِّلة والمواد غير الموصِّلة.



السؤال

ما الميزة المُشتركة في التركيب البنائي للعيّنات التي توصّل الكهرباء؟

أسئلة

- ١-٣ ما الخصائص المُشتركة بين جميع الفلزّات؟
 - ٣-٣ كم عُنصرًا في الدورة (1)؟
- ٣-٣ صنّف الخصائص الآتية في جدول من عمودين: فلزّات ولافلزّات.

يُعتبر مادة عازلة قابل للطرق وللتحويل إلى صفائح يصدر رنينًا عند طرقه موصِّل للحرارة له سطح باهت اللون موصِّل للكهرباء


موصل للكهرباء

التركيب الإلكتروني والجدول الدوري

يمكننا الآن ربط خصائص أي عنصر ربطًا مباشرًا بموقعه في الجدول الدوري وبتركيبه الإلكتروني (الشكل٣-٤). فنلاحظ أنه عند الانتقال عبر الدورة في الجدول الدوري (من اليسار إلى اليمين)، يُضاف إلكترون إلى مستوى الطاقة الخارجي نفسه عند الانتقال من عُنصر إلى العُنصر الذي يليه. وبذلك تملأ عناصر الدورة الواحدة مستوى الطاقة نفسه، فعناصر الدورة (1) تملأ إلكتروناتها مستوى الطاقة الأول، في حين أن العناصر التي تنتمي إلى الدورة (3) تمتلك ثلاثة مستويات طاقة إلكترونية. وفي المجموعات الرئيسية Main-group تُلاحِظ أن العناصر التي تنتمي إلى المجموعات النالي المجموعة نفسها تمتلك العدد نفسه من الإلكترونات الخارجية. فعلى سبيل المثال تمتلك العناصر التي تنتمي إلى المجموعة اا إلكترونين في مستوى الطاقة الخارجي. أما العناصر التي تنتمي إلى المجموعة الا فتمتلك سبعة إلى المجموعة الا الكترونات.

فذرّة الماغنيسيوم مثلاً تمتلك إلكترونين في مستوى الطاقة الخارجي الثالث، وهي بالتالي تنتمي إلى المجموعة الوالدورة (3). وتمتلك ذرّة الأرغون مستوى طاقة خارجيًا يحتوى على ثمانية إلكترونات، وهي بذلك تنتمي إلى

المجموعة IIIV. أما ذرّة البوتاسيوم فتمتلك إلكترونًا واحدًا في مستوى الطاقة الخارجي الرابع، وهي بالتالي تنتمي إلى المجموعة ا والدورة (4).



الشكل ٣-٤ العلاقة بين موقع العُنصر في الجدول الدوري والتركيب الإلكتروني لذرّاته

يقع في الدورة 3

يرتبط التركيب الإلكتروني Electron arrangements للذرّات بموقعها في الجدول الدوري

- تمتلك ذرّات العناصر التي تقع في المجموعة نفسها العدد نفسه من الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية وهو ما يمثل رقم المجموعة.
- تتميّز عناصر المجموعات الرئيسية، بأن رقم
 المجموعة هو عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى
 الطاقة الخارجي لذرّات هذه العناصر.
 - يمثل رقم الدورة عدد مستويات الطاقة الإلكترونية للعنصر.


ويُستفاد من الربط بين التركيب الإلكتروني للعُنصر وموقعه في الجدول الدوري في معرفة طبيعة العنصر إن كان فلزًّا أو لافلزًّا. فالعناصر التي تنتمي إلى المجموعات من ا إلى ااا والتي تملك ذرّاتها عددًا قليلاً من الإلكترونات في مستويات الطاقة الخارجية، هي فلزّات هذه العناصر إلكتروناتها الخارجية بسهولة نسبيًا مكوّنةً ("بحرًا" من الإلكترونات) الذي يُشكِّل الرابطة الفلزية لهذه العناصر (ستتمّ دراستها في الصف العاشر). في المقابل، فإن العناصر التي تملك ذرّاتها عددًا كبيرًا من الإلكترونات الخارجية (المجموعات من ١٧ إلى ١٧١) تُشكِّل عادة روابط تساهمية (ستتمّ دراستها في الوحدة الرابعة)، وتكون بالتالي لافلزّات

ولمّا كانت الإلكترونات الخارجية للذرّة هي التي تُحدِّد بشكل رئيسي الخصائص الكيميائية لأي عنصر، فإن العناصر التي تتتمي إلى مجموعة واحدة تمتلك خصائص مُتماثلة. وجديرٌ بالذكر أن هناك تراكيب إلكترونية مُعيَّنة أكثر استقرارًا من سواها، وهي تلك التي يكون المستوى الخارجي للطاقة فيها "ممتلئًا" بالإلكترونات، وتتمثل في عناصر المجموعة االا أو الغازات النبيلة Noble gases التي تتميَّز بأنها خاملة جدًا كيميائيًا (غير نشطة).

۲-۳ دورية خصائص العناصر في الجدول الدورى

كما ذكرنا سابقًا، فإن موقع العُنصر في الجدول الدوري يتيح لنا توقُّع بعض خصائصه. ولكن هناك أيضًا ما يُميّز ترتيب العناصر في الدورات والمجموعات وهو وجود تدرُّج واضح لبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية في اتجاهات مُحدَّدة. لنأخذ على سبيل المثال عناصر الدورة (3) التي تبدأ بالصوديوم وتنتهي بالأرغون. ستلاحظ أننا عند تحرُّكنا عبر هذه الدورة ننتقل من العناصر الفلزية إلى شبه الفلزية ثم إلى العناصر اللافلزية. فعُنصر الصوديوم هو فلز قلوي نشط، أما الأرغون فهو لافلز غير نشط. ويتوسَّط الدورة عُنصرالسيليكون الذي يُصنف من أشباه الفلزّات. ذلك الأمر يجعلك تستنتج انخفاض الصفة الفلزّية للعناصر بالانتقال نحو اليمين عبر الدورة.


ويُعدّ النشاط الكيميائي من الخصائص المُهِمّة التي تتدرَّج بشكل دوري أيضًا في مجموعات الجدول الدوري. وتُلاحظ في الشكل (٣-٥) أن الفلزّات تصبح أكثر نشاطاً كيميائيًا كلما اتّجهنا إلى أسفل الجدول الدوري، بخلاف اللافلزّات التي يزداد نشاطها الكيميائي صعودًا في المجموعة الواحدة.



أسئلة

- **٣-٤** ما وجه الشبه في التركيب الإلكتروني لذرّات الغازات النبيلة؟
- ٣-٥ ما التغيُّر الذي يحدث في نوع العنصر، عندما نتِّجه عبر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين؟
 - ٦-٣ من دون الرجوع إلى الجدول الدوري،
 - أ. حدِّد الدورة والمجموعة للعُنصر ذي التركيب الإلكتروني (1، 8، 8، 2).
- ب. اكتب التركيب الإلكتروني للعُنصر الموجود في الدورة (3) والمجموعة V.
- ج. صنِّف عُنْصرَي الجُزئيَّتَين أعلاه (أ) و (ب) كفلزّات أو لافلزّات.

وإذا نظرنا إلى عناصر المجموعة ١٧ نجد عند الانتقال من أعلى المجموعة إلى أسفلها تغيُّر صفة العناصر من لافلزَّية إلى فلزَّية، ونجد عُنصرَين من أشباه الفلزَّات يتوسَّطان تلك المجموعة (الشكل ٣-٢).



الشكل ٣-٦ الدورية في بعض عناصر الدورة 3، وعناصر المجموعة ١٧

ملخّص

ما يجب أن تعرفه:

- يرتّب الجدول الدوري عناصر الكون وفقًا لزيادة العدد الذرّي.
- يُساعد التركيب الإلكتروني للذرّات على تحديد مواقع
 كل من العناصر الفلزّية واللافلزّية في الجدول الدوري
 والتمييز بين خصائصها المختلفة.
- يتألّف الجدول الدوري من مجموعات ودورات ذات تدرّج
- واضح في الخصائص، وذلك عند الانتقال من أعلى إلى أسفل عبر المجموعة، أو من اليسار إلى اليمين عبر الدورة.
- تضمّ مجموعة الفلزّات القلوية (المجموعة ا) ومجموعة الهالوجينات (المجموعة الا) على التوالي أكثر الفلزّات واللافلزّات نشاطًا.

أسئلة نهاية الوحدة

أكمل الجُمَل الآتية المُتعلِّقة بالجدول الدوري، مُستخدمًا الكلمات في القائمة أدناه:

اليُمنى	المجموعة	فلزّات	الإلكترونات	الجدول الدوري
رّية. تقع العناصر	ة وفقًا لازدياد أعدادها الذ	سر الكيميائية مُرتّب	عن قائمة تضمّ كل العنام	عبارة
	ن رقم المجموعة مُساويًا لع	نفسها . ویکور	شابهة في	الرئيسية ذات الخصائص المت
			خارجي للذرَّة.	الموجودة في مستوى الطاقة اا
-وري.	رى والسُّفلى من الجدول الد	, تشغل الجهة اليُس	وهي	مُعظَم العناصر عبارة عن
	•	من الجدول الدوري	والعليا ه	تشغل اللافلزّات الجهة

\Upsilon يحتوي الجدول الآتي على التراكيب الإلكترونية لبعض الذرّات الموضّحة بالرموز الافتراضية الآتية:

التركيب الإلكتروني	العنصر
2, 8, 8	А
2, 4	В
2, 8, 1	С
2, 8, 8, 2	D
2, 6	Е

اذكر الرمز المُناسِب لكلّ ممّا يأتي:

- أ. عنصرٌ من المجموعة ا.
- ب. عُنصران من الدورة نفسها.
 - ج. عُنصران فلزّيان.
 - د. ثلاثة عناصر لافلزّية.
 - **ه.** عنصر خامل.
- ٣ اكتب المصطلحات التالية وطابقها مع تعريفها.


توجد هذه العناصر إلى يسار ووسط الجدول الدوري وتكون لامعة وموصِّلة للكهرباء.
عمود في الجدول الدوري.
توجد هذه العناصر إلى يمين وأعلى الجدول الدوري وتكون عازلة للكهرباء.
صف أفقي في الجدول الدوري.
طريقة لتصنيف العناصر.

الجدول الدوري
الفلزّات
اللافلزّات
المجموعة
الدورة

ع يوضح الشكل أدناه صفًا أفقيًّا من الجدول الدوري.

Li Be	В	С	N	0	F	Ne
-------	---	---	---	---	---	----

- أ. ما رقم الدورة التي ينتمي إليها هذا الصف في الجدول الدوري؟
- ب. أجب عن الأسئلة الآتية، مُستخدِمًا فقط العناصر الواردة في الصف الأفقي أعلاه. يمكنك استخدام العنصر مرة واحدة أو أكثر من مرة، وقد لا تستخدمه على الإطلاق.
 - ١. سمّ العنصر الذي ينتمي إلى مجموعة الهالوجينات.
 - ٢. أكتب رموز العناصر الفلزية الواردة في هذا الصف.
 - ج. ما وجه الشبه في التركيب الإلكتروني لهذه العناصر؟
 - ه يمتلك عنصر البوتاسيوم، K، عددًا ذرّيًا يساوى 19.
 - أ. ارسم، مستخدمًا الشكل المقابل، التركيب الإلكتروني الكامل لذرّة البوتاسيوم.
 - ب. حدّد رقم الدورة التي ينتمي إليها هذا العُنصر.
 - ج. اشرح كيف يمكنك، بالاعتماد على التركيب الإلكتروني لهذا العنصر، تحديد المجموعة التي ينتمي إليها في الجدول الدوري.
 - 🖜 حدّد من دون الرجوع إلى الجدول الدوري، المجموعة والدورة للذرّات ذات التركيب الإلكتروني الآتي:
 - **(**2, 3**) -.**
- (2, 8, 6)
- (2, 8, 2)
- اكتب التركيب الإلكتروني لكل من:
- أ. عُنصر في المجموعة ١١ والدورة 4.
 - ب. غاز نبيل في الدورة الثانية.
- ♦ بالعودة إلى الجدول الدوري، سمّ كلاً من العناصر المذكورة في السؤالين ٦ و ٧ واكتُب رمزه. ثم صنّف تلك العناصر كفلزّات ولافلزّات.
 - أيهما أكثر أهمية بعد تحديد مجموعة عنصر ما، خصائص العُنصر أم تركيبه الإلكتروني؟ فسّر إجابتك.
- اكتب من دون الرجوع إلى الجدول الدوري، التركيب الإلكتروني الخارجي لعُنصر من المجموعة VII والدورة 2. وحدِّد طبيعته (فلزِّى، أو لافلزِّى أو شبه فلزِّى) واذكر اسم المجموعة التي ينتمي إليها.
 - الكتب من دون الرجوع إلى الجدول الدوري، التركيب الإلكتروني الخارجي لعُنصر من المجموعة VIII والدورة 3. ما اسم المجموعة التي ينتمي إليها هذا العُنصر؟ اذكر خاصّية فيزيائية له، وأخرى كيميائية.



الوحدة الرابعة

الروابط الكيميائية Chemical Bondings

تُغطّى هذه الوحدة: ا

- الروابط الكيميائية وأهميّتها
 - الرابطة الأيونية
 - الرابطة التساهُمية
- صيغ المُركّبات الأيونية والتساهُمية
- الأشكال البنائية المختلفة للكربون
 - الجُزيئات الضخمة

٤-١ الروابط الكيميائية وأهمّيّتها

تندمج العناصر المختلفة معًا لتكوّن مجموعة واسعة ومتنوِّعة من المُركَّبات التي تُشكِّل عالمنا. وإذا نظرت حولك ستلاحظ تنوُّعًا كبيرًا للمُركَّبات، ستجد منها مواد خاملة ومُقاومة للحرارة وأخرى شديدة الانفجار، كما أن هناك جُزيئات سامّة قاتلة وأخرى تُمثّل جُزيئات الحياة. تتكوّن المُركّبات نتيجة للترابُط الكيميائي بين ذرّاتها. وتُظهر المُركّبات البسيطة، مثل الماء والأمونيا والميثان، التنوُّع الذي يمكن تحقيقه عندما تندمج ذرّات العناصر

معًا. فالماء مثلًا يتكوّن من الهيدروجين والأكسجين، إذ يحتوي كل جُزيء ماء على ذرَّتي هيدروجين مرتبطتَيَن بذرّة أكسجين واحدة.

ويوجد نوعان رئيسيان من الروابط التي تجعل المُركَّبات متماسكة: النوع الأول هو الرابطة الأيونية التي تنتج عن انتقال الإلكترونات من ذرّة إلى أخرى. والنوع الثاني، هو الرابطة التساهُمية التي تتضمَّن عملية تشارُك في الإلكترونات بين الذرّات.

يحدث الترابُط الكيميائي Chemical bonding عن طريق الإلكترونات الخارجية لكل ذرّة. فإذا تأمّلنا مجموعة من الموادّ نلاحظ أن الإلكترونات الخارجية للذرّات المُكوّنة لها هي التي تُحدِّد نوع الترابُط الذي يجعل التركيب مُتماسكًا. وما التنوُّع الذي نشاهده في العالم المادي إلّا بسبب اختلاف الطرائق التي ترتبط بها الذرّات معًا.

تترابط الذرّات فيما بينها لتُحقِّق التركيب الإلكتروني الأكثر استقرارًا وذلك يعني أن مستويات الطاقة الخارجيّة للذرّات المُشاركة في الترابط الناتج تصبح "مُمتلئةً" بالإلكترونات لتمتلك بالتالي تركيبًا إلكترونيًا مماثلًا للغاز النبيل الأقرب إليها في الجدول الدوري (في الدورة نفسها أو في الدورة التي تسبقها مباشرة). فمثلًا عناصر كالأكسجين (20) والهيدروجين (H2)، لا توجد على شكل ذرّات منفردة، بل تكوّن جُزيئات ثُنائية الذرّات منفردة، بل أكثر استقرارًا وواقع الأمر أن العناصر الوحيدة المُكوَّنة من ذرّات مُنفردة تتحرَّك بشكل شبه مُستقلِّ بعضُها عن بعض هي الغازات النبيلة، عناصر المجموعة (III) فهذه العناصر هي التي يكون التركيب الإلكتروني لذرّاتها الأكثر استقرارًا، ولهذا السبب لا تتَّحد ذرّاتها معًا .


من المعروف أن مُعظم ذرّات العناصر تتَّحد لتكوين مُركّبات عن طريق أنواع مختلفة من الروابط. فالعناصر اللافلزّية تترابط ذرّاتها برابطة تساهُمية Covalent bond في حين أن المُركّبات التي تتكوّن من جُزءين أحدهما فلزّ والآخر

لافلز تنتج عن نوع مختلف من الترابُط. في هذا الترابط تنتقل الإلكترونات، وينتج عن هذا الانتقال جُسَيمات ذات شحنات مُتعاكسة تُعرَف بالأيونات. ويؤدي تكوُّنها إلى نوع مختلف من الروابط الكيميائية يُسمّى: الرابطة الأيونية lonic bond

الروابط في العناصر والمُركّبات

- ترابط ذرّات العناصر الفلزّية واللافلزّية بواسطة الرابطة الأيونية lonic bonding التي تنشأ بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة لتشكّل المُركّبات.
- تترابط ذرّات العناصر اللافلزّية بواسطة الرابطة التساهمية العناصر اللافلزّية بواسطة الرابطة التساهمية التساهمية Simple molecules كجُزيئات العناصر الغازية مثل O₂ أو جُزيئات المُركَّبات التساهمية البسيطة مثل HCl.
- تترابط الأيونات في الرابطة الأيونية بوساطة قوى جذب كهروستاتيكية شديدة Electrostatic forces ، فتكوّن شبكات أيونية ضخمة Giant ionic lattices في البلّورات الصلبة.
- عند بعض المُركَّبات (SiO₂ على سبيل المثال) يمكن أن تؤدّي الرابطة التساهمية إلى تكوين شبكات تساهمية ضخمة Giant covalent lattices.


يُبيِّن الشكل (٤-١) تمثيلًا بيانيًّا مُختصَرًا لأنواع الروابط الموجودة في العناصر والمُركَّبات الكيميائية البسيطة والضخمة.



الرابطة الأيونية - المُركّبات الأيونية

تتضمَّن المُركَبات المكوَّنة من الفلزّات واللافلزّات، في العادة، نوعًا من الروابط يعتمد على عملية انتقال الإلكترونات من ذرّة إلى أخرى. حيث تؤدّي هذه العملية إلى تشكُّل أيونات موجبة (كاتيونات) وأخرى سالبة (أنيونات). فتترابط تلك الأيونات المشحونة بشحنات مُتعاكِسة بفضل قوى التجاذُب القائمة بينها.

أشهر مثال على مُركَّب تتشكَّل فيه رابطة أيونية هو كلوريد الصوديوم. ذلك أن ذرّة الصوديوم، التي تملك التركيب الإلكتروني (2،8،1)، تفقد إلكترونها الوحيد الذي يشغل مستوى الطاقة الخارجي لتُشكِّل أيون الصوديوم الموجب (Na⁺). عندئذ يكون أيون الصوديوم قد امتلك التركيب الإلكتروني المُستقرِّ لذرّة النيون (2،8)، وهو العُنصر الذي يسبق الصوديوم مباشرة في الجدول الدوري. وتصبح الذرَّة أيونًا ذا شحنة أُحادية موجبة، لامتلاكه 10 إلكترونات في المجمل، ووجود 11 بروتونًا في نواته. أما الإلكترون الذي فقدته ذرّة الصوديوم في نتقتل إلى ذرّة الكلور.




ذرّة صوديوم Na [1، 2،8]

أيون صوديوم ⁺Na ⁺[8 ،2]

الشكل ٤_٢ تفقد ذرّة الصوديوم إلكترونًا لتكوِّن أيون صوديوم


تكسب ذرّة الكلور، التي تملك التركيب الإلكتروني (2،8،7)، إلكترونًا واحدًا مصدره ذرّة الصوديوم، فتكوِّن أيون كلوريد سالبًا (-CI) (الشكل -T). وهذا الأيون يملك



أيون كلوريد -[8،8] ذرّة الكلور [2،8،7] الشكل ٤٣٠ تكسب ذرّة الكلور إلكترونًا واحدًا لتكوِّن أيون كلوريد

التركيب الإلكتروني لذرّة الأرغون (2،8،8). كما أنه يملك شحنة سالبة، لأن عدد إلكتروناته (18) وهو أكبر من عدد البروتونات الموجودة في نواته (17).

تكون الأيونات الموجبة والأيونات السالبة في مُركَّب كلوريد الصوديوم مترابطة بفضل التجاذب الكهروستاتيكي الشديد بين الشحنات المُتعاكسة (الشكل ٤-٤).




كلوريد الصوديوم (NaCl)

الشكل ٤-٤ انتقال الإلكترون من ذرّة الصوديوم إلى ذرّة الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم

يمكن لذرّات الفلزّات أيضًا تكوين أيونات ثنائية أو ثلاثية موجبة وذلك عن طريق فقد إلكترونين أو ثلاثة إلكترونات، كما يمكن لذرّات اللافلزّات كسب أكثر من إلكترون واحد. وفي جميع الأحوال تسعى تلك الذرّات للوصول إلى الاستقرار باكتمال مستوى الطاقة الخارجي.

لذا عليك أن تكون أكثر انتباهًا عند تمثيل الرابطة الأيونية لعناصر أخرى فلزية ولافلزية.

يُبِيّن (الشكل (٤-٥) مثالَين على تلك المُركَّبات.



الشكل ٤-٥ مُخطّطات تُبيّن تشكُّل الروابط الأيونية في كل من أكسيد الماغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم.


الرابطة الأيونية

- تفقد ذرّات الفلزّ إلكتروناتها الخارجية لتكوّن أيونات موجبة (كاتيونات Cations).
- يكون عدد الشحنات الموجبة على أيون الفلزّ مُساويًا لعدد الإلكترونات المفقودة.
- تكسب ذرّات اللافلزّات الإلكترونات لتصبح أيونات سالبة (أنيونات Anions)، وكذلك يكسب الهيدروجين الإلكترونات مكونًا أيون هيدريد (-H).
- يكون عدد الشحنات السالبة على أيون اللافلز مساويًا لعدد الإلكترونات المُكتَسبة.
- في كلتا الحالتين، تمتلك الأيونات المُتكوِّنة ترتيبًا الكترونيًا أكثر استقرارًا. ويكون هذا الترتيب في العادة مُشابهًا لترتيب ذرّات الغاز النبيل الأقرب إلى العُنصر.
 - تتشكَّل الروابط الأيونية نتيجة التجاذُب الشديد بين
 الأيونات ذات الشحنات المُتعاكسة.

المجموعات الأيونية

تتكوّن المُركّبات الأيونية التي تمّ ذكرها حتى الآن من أيونات بسيطة، مثل $^{-}$ O²· $^{-}$ O³· $^{-}$ Na⁺ $^{+}$ K⁺ $^{+}$ Mg²⁺ $^{+}$ Cl⁻ $^{-}$ O² أيون الفلزّ في كثير من المُركّبات الأيونية المُهمّة مع أيون سالب يحتوي على مجموعة من الذرّات (مثل $^{-}$ NO₃ $^{-}$ CO₃ وتتكوّن تلك المجموعات الأيونية lonic groups من ذرّات مُترابطة بروابط تساهمية، وتحمل شحنة كليّة

لتُشكِّل تركيبًا مُستقرًا. وقد أُدرِجت بعض الأمثلة على تلك المجموعات في (الشكل 3-7)، كما يحتوي هذا الشكل أيضًا على مجموعة أيونية مُهمّة تحمل شحنة موجبة هي أيون الأمونيوم $+NH_4$. يقدِّم (الجدول 3-1) ملخّصًا لبعض الأيونات البسيطة والمجموعات الأيونية.



الشكل ٤-٦ ثلاثة أمثلة على مجموعات أيونية تحمل شحنة سالبة ومثال على مجموعة أيونية تحمل شحنة موجبة

جموعات الأيونية	الم	أيونات اللافلزات البسيطة		أيونات الفلزّات	*
(-)	(+)	(-)	(+)	البسيطة (+)	التكافؤ*
هیدروکسید، ⁻ OH	NH_4^+ أمونيوم،	ھیدرید، ⁻H	البروتون (كاتيون	صوديوم، ⁺Na	1
			الهيدروجين)، +H**		
نترات، ⁻ NO ₃		کلوری <i>د</i> ، ⁻Cl		بوتاسيوم، +K	
كربونات هيدروجينية، ⁻HCO₃		برومی <i>د</i> ، ⁻ Br		فضّة، ⁺Ag	
		يودي <i>د</i> ، ⁻ ا		نحاس (۱)، †Cu	
کبریتات، SO ₄ 2		أك <i>سيد</i> ، ⁻⁰²		ماغنيسيوم، +Mg²	2
کربونات، ^{-CO₃2}		کبریتید، ^{-S2}		كالسيوم، ⁺Ca	
				خارصین، ^۲ -Zn	
				حدید (۱۱)، Fe ²⁺	
				نحاس (II)، Cu ²⁺	
فوسفات، ^{−3} PO₄		نیتری <i>د</i> ، ^{-N3}		ألومنيوم، +Al3	3
				حدید (III)، Fe³+	

^{*} التكافؤ هو عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة

الجدول ١-٤ بعض الأيونات البسيطة والمجموعات الأيونية الشائعة

الروابط في اللافلزّات - الرابطة التساهُمية الروابط التساهُمية في العناصر

يوجد الفلور عادة في هيئة جُزيئات ثُنائية الذرّات (F₂). وفيه ترتبط ذرّتان معًا من خلال تشاركهما في الإلكترونات. وتتداخل مُستويات الطاقة مُكوِّنة الجُزىء (الشكل ٧-٤).

يُعرَف تشارُك الإلكترونات بهذه الطريقة باسم الرابطة التساهُميَّة Covalent bond. وتقع إلكترونات الرابطة غالبًا بين نواتَي الذرَّتين. ويمكن رسم زوج إلكترونات الرابطة المشتركة في هيئة خط واحد مفرد يصل بين الذرَّتين. يطلق على الرابطة التي تنتج عن التشارك في زوج واحد من الإلكترونات تسمية الرابطة التساهمية الأحادية.

الرابطة التساهُميَّة الأُحادية

النيون لا تشكّل جُزيئات (Ne₂).

■ تتشكَّل الرابطة من تشارُك ذرّتين بزوج من الإلكترونات.


في جُزيء الفلور تُشارك كلّ ذرّة فلور بإلكترون واحد

ليكتمل المُستوى الخارجي لها بثمانية إلكترونات، وهو

التركيب الإلكتروني نفسه للنيون، وهو أقرب غاز نبيل إلى

الفلور. تذكّر أن التركيب الإلكتروني للنيون مستقرٌّ. فذرّات

- تُسهم كل ذرّة بإلكترون واحد لكل رابطة.
- تتشكّل الجُزيئات من الذرّات المُترابطة بروابط تساهُميّة.




الشكل ٤-٧ يتكون جُزيء الفلور عند تشارُك الذرّتين في الإلكترونات. ويمكن استخدام النموذج الجُزيئي لإظهار تداخُل الذرّات

^{**} هذا الأيون، على عكس باقي الأيونات، غير موجود عمليًا، في الحالة الحرّة.

يُشكّل كثير من العناصر اللافلزّية جُزيئات ثُنائيّة الذرّات. إلا أن العناصر كلّها، (عدا الهيدروجين)، تشكّل الروابط بهدف الوصول إلى ثمانية إلكترونات لمُستويات الطاقة الخارجية، كالغازات النبيلة، (عدا الهيليوم). وهكذا تُشكِّل الهالوجينات (عناصر المجموعة VII) جُزيئات تساهُمية.

يتم الترابُط بين ذرَّتَى الهالوجين (بين ذرَّتَى كلور هنا) عبر رابطة تساهمية أحادية. حيث تستخدم مثل هذه الرابطة إلكترونين اثنين، واحدًا من كل ذرَّة (الشكل ٤-٨).



الشكل ٤ـ٨ تتشكَّل الرابطة التساهُميَّة في جُزيئات الكلور (Cl₂). حيث تكسب كل ذرّة إلكترونًا واحدًا في عملية التشارك للوصول إلى ثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي.

ولكن يجب أن نتذكّر أننا عندما نرسم مُخطّطات توضّح تداخُل مستويات الطاقة الخارجية للذرّات، نُظهر الإلكترونات الخارجية فقط. وسبب ذلك أن الإلكترونات الداخلية لا تُشارك في هذا الترابُط. وهكذا تكسب كل ذرّة الإلكترونات في عملية التشارك، ويصبح لديها ثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي.

عندما تتشكّل جُزيئات الأكسجين (O_2) أو النيتروجين (N_2) ، يُستخدَم المزيد من الإلكترونات في عملية الترابط، لكي تكسب الذرّات ثمانية إلكترونات. وتترابط هذه الذرّات برابطة تساهمُيّة ثنائية (O2) أو برابطة تساهمُيّة ثلاثية (N₂) (الشكل ٤-٩). وتُسمّى روابط تساهمُيّة مُتعدّدة.




الشكل ٤-٩ التركيب البنائي لجُزيئات النيتروجين (N2)، . يحتوى جُزىء النيتروجين على رابطة ثلاثية

الروابط التساهُميَّة في المُركّبات

وكما هي الروابط في حالة العناصر التي ذكرناها من قبل، كذلك هي الروابط التي تتشكَّل بين ذرّات اللافلزّات المختلفة في المُركّبات التساهُمية، تتكوّن من عملية التشارُك في الإلكترونات بين الذرّات.

يتطلُّب تكوين جُزيء كلوريد الهيدروجين (HCI) تشارُك ذرّتي الهيدروجين والكلور في زوج واحد من الإلكترونات (الشكل ٤-١٠).



تمتلك ذرّة الكلور سبعة إلكترونات في مستوى الطاقة الثالث.

مستوى طاقتها الثالث

تمتلك ذرّة الهيدروجين إلكترونًا واحدًا فقط في مستوى الطاقة الأول.

إذا تشاركت الذرّتان في زوج واحد من الإلكترونات: ويمكن لذرّة الهيدروجين أن تملأ مستوى طاقتها الأول يمكن لذرّة الكلور أن تملأ

جُزىء كلوريد الهيدروجين زوج الإلكترونات H-CI



الشكل ٤-١٠ تتشارك ذرّتا الهيدروجين والكلور بزوج واحدمن الإلكترونات لتكوين جُزيء كلوريد الهيدروجين

وتوضِّح الأمثلة المبيَّنة في الشكل (٤-١١) طرائق مختلفة لتمثيل عملية التشارك تلك، كما توضِّح كيف تتوافق صيغة المُركَّب مع أعداد كل نوع من الذرَّات الموجودة في الجُزيء. حيث يُشكِّل جُزيء الماء والأمونيا والميثان روابط أحادية، كما تكون مركبات أخرى كثاني أكسيد الكربون روابط ثنائية. إذ يرتبط جُزيء ثاني أكسيد الكربون بوساطة رابطتين ثنائيتين بين ذرَّة كربون وذرَّتَي أكسجين، ويبيّن الشكل (٤-١٢) أمثلة أخرى على الروابط في المُركَّبات.

وفي كل حالة يتماثل عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي للذرّات بين كل عُنصر والغاز النبيل الأقرب إليه في الجدول الدوري.

تذكّر

تدرَّب على رسم المُخططّات لكل من الروابط التساهُمية والأيونية.

عندما ترسم مُخطَّطات للرابطة الأيونية تأكَّد من أنك تتذكَّر وضع الشحنات خارج الأقواس على كل أيون.

المُركّب	تكوّن الرابطة	الصيغة الشائعة	النموذج الجُزيئي
الميثان CH₄	4 (H) + (C) (H) (C) (H) (I) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	H H—C—H H	H C H
الأمونيا NH₃	3 (H) + (N) → (H) N (H) ثلاث ذرّات ذرّة نيتروجين هيدروجين جُزيء أمونيا واحدة (2،5) (1)	Й Н Н	HNH
اڻماءِ H ₂ O	2 (H) + (O → H) O ذرة أكسجين هيدروجين خُزيء ماء واحدة (2،6) (1)	H—Ö: H	H.O. H
ثان <i>ي</i> أك <i>سيد</i> الكربون CO ₂	2 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	;ò =c=ọ;	

الشكل ١١-٤ أمثلة على تكوين جُزيئات تساهُميَّة بسيطة

المُركُّب	تكوُّن الرابطة	الصيغة الشائعة	النموذج الجُزيئي
الإيثين C₂H₄	$4 \frac{H}{c} + 2 \frac{C}{c} \rightarrow \frac{H}{c} \frac{H}{c} \frac{H}{c}$ $c \frac{H}{c} \frac{H}{c} \frac{H}{c}$ $c H$	H C=C H	
الإيثانول C₂H₅OH	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	H H H-C-C-Ö-H H H	

الشكل ٤-١٢ تكوين جُزيئات الإيثين والإيثانول

مصطلحات علمية

- الأنيون Anions: الذرَّة التي اكتسبت إلكترونًا واحدًا أو أكثر (الأيون السالب).
 - الكاتيون Cations: هو الذرَّة التي فقدت إلكترونًا واحدًا أو أكثر (الأيون الموجب).
 - الرابطة الأيونية lonic bond؛ هي الرابطة التي تنشأ من التجاذب الكهروستاتيكي الشديد بين أيونات ذات شحنات
- مُتعاكسة (أنيونات وكاتيونات). ينتج عن هذه الرابطة مُركّبات أيونية lonic compounds.
- الرابطة التساهمية Covalent Bond: هي الرابطة التي تنشأ من التشارُك في زوج واحد من الإلكترونات أو أكثر بين ذرَّتَين. ينتج عن هذه الرابطة مُركَبات تساهمية . compounds

أسئلة

- ١-٤ ما نوع الرابطة التي تتشكّل بين أزواج العناصر الآتية؟
 - أ. الكبريت والكلور
 - ب. الكربون والأكسجين
 - ج. الماغنيسيوم والنيتروجين
 - ۲-٤ لماذا تُكتب صيغة الهيدروجين دائمًا على الشكل ٢-٤
 - ٣-٤ ما القوة المسؤولة عن ترابط الصوديوم والكلور في مُركب كلوريد الصوديوم؟
 - ٤-٤ ارسم مُخطَّطات للروابط التساهُمية في العناصر والمُركّبات الآتية (مُبينًا فقط الإلكترونات الخارجية للذرّات):

- ب. الماء أ. غاز الهيدروجين
- ج. الأمونيا
- د- الميثان
- ٤-٥ ارسم مُخطّطات التمثيل النقطى للروابط الأيونية في المُركّبات الآتية:
 - أ. كلوريد الصوديوم ب. فلوريد الليثيوم
 - د. كلوريد الكالسيوم ج. أكسيد الماغنيسيوم
- ٦-٤ يمتلك مُركَّب كربونات الصوديوم روابط أيونية وأخرى تساهُميَّة، فسِّر ذلك.

نشاط ٤-١

نمذجة الرابطة في المركبات التساهُمية

المهارات:

- يُبيّن بطريقة عملية المعرفة المتعلقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والأدوات (بما فيها اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - ينجز التجربة ويسجّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويقيِّمها.

الطريقة

- ا ستصمم في هذا النشاط نماذج جزيئية لبعض العناصر والمُركَّبات. (كلوريد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والأمونيا والميثان). مع التركيز على نوعية الروابط التساهُميَّة الأحادية والثنائية والثلاثية المُتشكِّلة في الجُزيئات.
- استخدم النماذج التي صمّمتها لمساعدتك في إكمال
 الجدول التالي مع رسم التراكيب البنائية لهذه العناصر
 والمُركَّبات.

رسم التركيب البنائي	الصيغة	العنصر/ المركب
	H_2	الهيدروجين
	Cl ₂	الكلور
	O ₂	الأكسجين
	N_2	النيتروجين
	H₂O	الماء
	HCI	كلوريد الهيدروجين
	NH ₃	الأمونيا
	CH₄	الميثان
	C₂H₄	الإيثين

نشاط ٤-١

رسم التركيب البنائي	الصيغة	العنصر/ المُركَّب
	CO_2	ثاني أكسيد الكربون
	C₂H₅OH	الإيثانول
	CH₃COOH	حمض الإيثانويك

٤-٢ الصيّغ الكيميائية

إن اعتماد "الاختصار" الكيميائي لتمثيل العناصر الكيميائية، باستخدام رموزها، يساعد كثيرًا في تبسيط عملية تدريس الكيمياء وجعل هذه المادة أكثر سلاسة وقبولا لدى الطلاب. وخاصة عند تطبيق هذا الاختصار لتمثيل أي من العناصر أو المُركَّبات باستخدام صيغته الكيميائية Chemical formula .

ويمكن كتابة صيغ المُركَّبات التي تتضمَّن الأيونات المُدرَجة في الجدول (٤-١) بسهولة إذا عرفنا أن الشحنة الكليَّة للصيغة تساوي الصفر، وأن الشحنة الموجبة الكليَّة يجب أن تساوى الشحنة السالبة الكليَّة.

صيَغ المُركَّبات الأيونية

تكون المُركّبات الأيونية في الحالة الصلبة عند درجة حرارة الغُرفة. وتتمثّل صيعنها ببساطة في نسبة الأعداد الصحيحة للأيونات الموجبة إلى الأيونات السالبة الموجودة في تركيب المادة. فعلى سبيل المثال يحتوي مُركَّب كلوريد الماغنيسيوم على أيونيَن من الكلوريد (CI-) لكل أيون ماغنيسيوم (Mg²+):


وتكون صيغة المُركَّب MgCl₂. ولا بُدَّ من أن يكون التركيب مُتعادِلاً لا يحمل شحنة، حيث تُوازِن الشحنات الموجبة الشحنات السالبة.

وتكون قيمة الشحنة الموجودة على الأيون مقياسًا لتكافئه، أو قوّة اندماجه، (الجدول ٤-٢). إذ يمكن لأيونات 'Mg² أن تندمج مع أيونات 'Cl بنسبة 2:1، في حين ترتبط أيونات 'Na فقط بنسبة 1:1 مع أيونات 'Cl. ويمكن استخدام فكرة التكافؤ Valency للتأكّد من أنك تستخدم دائمًا الصيغة الصحيحة للمُركّب الأيوني. ادرس الأمثلة المطروحة أدناه لكل من أكسيد الألومنيوم وأكسيد الكالسيوم، وتأكّد من فهمك لكيفية إجراء ذلك.

صيغة أكسيد الألومنيوم


اكتب الرموز الصحيحة للعناصر.

اكتب الشحنات على الأيونات. مبادلة الشحنات



صيغة أكسيد الكالسيوم

اكتب الرموز الصحيحة للعناصر. اكتب الشحنات على الأيونات. مادلة الشحنات



يتم تطبيق القواعد نفسها عند كتابة صيغ المُركَّبات الأيونية التي تحتوي على مجموعات أيونية؛ لأن كلًا من تلك المجموعات تمتلك شحنة كلّية (الجدول 5-7). ومن المُفيد وضع صيغة المجموعة الأيونية بين قوسَين للتأكيد أنها ثابتة. فعلى سبيل المثال تكون صيغة أيون الكربونات دائمًا على هيئة -200. طبّق القواعد السابقة نفسها مع مثالَيُ: كربونات الصوديوم وكبريتات الأمونيوم.

صيغة كربونات الصوديوم

اكتب الرموز الصحيحة للأيونات. (CO₃) اكتب الرموز الصحيحة للأيونات. اكتب الشحنات على الأيونات. Na₂CO₃

يمكن الاستغناء عن الأقواس عندما يكون عدد المجموعة الأيونية واحدًا فقط

صيغ المُركَّبات التساهُميَّة

يمكن استخدام مبدأ التكافؤ أو قوة الاندماج لمعرفة صيغ المُركَّبات التساهُميَّة Covalent compounds. فتكافؤ الذرَّة هنا يُمثِّل عدد الروابط التساهُميَّة الأُحادية التي يمكن أن تُكوِّنها تلك الذرَّة. ويمكن تطبيق طريقة التقاطع هنا لإيجاد الصيغ الكيميائية على المُركَّبات التساهُميَّة في حالتين اثنتين هما:

• حالة الجُزيئات البسيطة التي تمتلك ذرَّة مركزية مثل الماء والميثان وثانى أكسيد الكربون والأمونيا:

صيغة ثانى أكسيد الكربون

اكتب الرموز الصحيحة للعناصر.

اكتب التكافؤ لكل ذرّة.

C O
4 ②
C2O4
: بسّط الصيغة:
CO2

صيغة كبريتات الأمونيوم

 (NH_4) (SO_4) (NH_4) (NH_4) (SO_4) (NH_4) (NH_4) (NH_4) (NH_4) (NH_4) (NH_4) (NH_4)

النسبة	الشق الأيوني الموجب	الشق الأيوني السالب	الصيغة	الاسم
1:1	Na⁺	CI ⁻	NaCl	كلوريد الصوديوم
1:1	NH ₄ ⁺	NO ₃ -	NH ₄ NO ₃	نترات الأمونيوم
2:1	K ⁺	SO ₄ ² -	K₂SO₄	كبريتات البوتاسيوم
1:2	Ca ²⁺	HCO₃ ⁻	Ca(HCO ₃) ₂	كربونات الكالسيوم الهيدروجينية
1:1	Cu ²⁺	SO ₄ ²⁻	CuSO₄	كبريتات النحاس (۱۱)
1:2	Mg ²⁺	NO ₃ ⁻	Mg(NO ₃) ₂	نترات الماغنيسيوم
1:3	Al ³⁺	CI-	AICI ₃	كلوريد الألومنيوم

الجدول ٤-٢ صيَغ بعض المُركّبات الأيونية

• حالة الجُزيئات التساهُميَّة الضخمة حيث تتمثّل الصيغة ببساطة في نسبة الأعداد الصحيحة للذرَّات الموجودة في الشبكة الضخمة، مثل ثنائي أكسيد السيليكون.

صيغة ثنائى أكسيد السيليكون

اكتب الرموز الصحيحة للعناصر.

اكتب التكافؤ لكل ذرّة.

Si₂O₄

SiO₂ الصيغة

بسِّط الصيغة:

أما عناصر المجموعة VIII فتكافؤها يساوى 0 (الصفر). يمكن رؤية هذه العلاقة بين التكافؤ ورقم المجموعة عند النظر في الأمثلة الواردة لعناصر الدورة 3.

- عناصر المجموعات ١٧-١، فإن: التكافؤ = رقم المجموعة.

- عناصر المجموعات V-VII فإن:

التكافؤ = 8 - رقم المجموعة.

إيجاد التكافؤ

يمكنك أيضًا أن ترى كيف يزداد التكافؤ ليصل إلى القيمة 4، ثم يتناقص ليصل إلى 0 (الصفر) عندما نتَّجه من اليسار إلى اليمين عبر الدورة الواحدة.

ويمكن إيجاد التكافؤ لأى عُنصر ينتمى إلى المجموعات

الرئيسية من رقم مجموعته، وفقًا للعلاقة المُبيَّنة أدناه.

المجموعة	I	II	Ш	IV	V	VI	VII	VIII/0
التكافؤ	1	2	3	4	3	2	1	0
مثال	NaCl	MgCl ₂	AICI ₃	SiCl ₄	PH ₃	H ₂ S	HCI	_

فعلى سبيل المثال، يقع الكربون في المجموعة ١٧، لذا يُساوى تكافؤه 4. ويقع الأكسجين في المجموعة ٧١، لذا يساوى تكافؤه 2 = 6 – 8

أسئلة

- ۷-٤ استخدم جدولك الدوري كي يُساعدك على إيجاد صيغة كل من المُركبات الآتية:
 - ١. كلوريد السيليكون
 - ٢. كبريتيد الكربون
 - ٣. ثلاثى كلوريد الفوسفور
 - ٤. ثنائي أكسيد السيليكون
 - ه. كبريتات البوتاسيوم
 - قلوريد الألومنيوم
 - ٧. أكسيد الحديد (١١١)
 - ٨. نترات الكالسيوم
 - ٩. كلوريد الخارصين
 - ١٠. الأمونيا
 - ١١. كلوريد الهيدروجين
 - ١٢. كبريتات النحاس (١١)
 - ١٣. ثلاثي أكسيد الكبريت

انتبه جيّدًا عند كتابة الصيغ الكيميائية بأن تكتب الرموز الصحيحة للعناصر. وتذكّر الرموز غير المُطابقة لأسماء عناصرها. وتذكّر بأن الحرف الثاني في رمز أي عُنصر يُكتَب حرفًا صغيرًا، وليس حرفًا كبيرًا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نكتب Na وليس NA، وCl وليس CL، وCo وليس .CO

مصطلحات علمية

التكافؤ Valency:

التكافؤ في الرابطة التساهُمية:

هو عدد الروابط الأحادية التي يمكن لذرّات عُنصر ما أن


التكافؤ في الرابطة الأيونية:

هو عدد الْإلكترونات التي تفقدها ذرّة الفلزّ فتصبح أيونًا موجبًا، (وهو يساوي قيمة الشحنة الموجبة لذلك الأيون)

هو عدد الإلكترونات التي تكسبها ذرَّة اللافلزّ فتصبح فتصبح أيونًا سالبًا (وهو يساوى قيمة الشحنة السالبة لذلك

أسئلة

- ٨-٤ ما عدد ذرَّات العناصر المختلفة الداخلة في صيغ المُركِّبات الآتية؟
 - ١. هيدروكسيد الصوديوم، NaOH
 - C₂H₆ ، الإيثان۲
 - ۳. حمض الكبريتيك، H₂SO₄
 - $Cu(NO_3)_2$ ، نترات النحاس(اا)، نترات النحاس
 - ه. السكّروز، C₁₂H₂₂O₁₁
- **٩-8** يوضِّح المُخطَّط التالي ترتيب الإلكترونات الخارجية الموجودة في جُزَيء حمض الإيثانويك.



- أ. سمِّ العناصر المختلفة الداخلة في هذا المُركَّب.
- ب. ما العدد الكُلّي للذرّات الموجودة في هذا الجُزيء؟
 - ج. أي ذرّتين تتشكّل بينهما رابطة تساهُميَّة ثُنائيّة؟
 - د. اكتب الصيغة الكيميائية للمُركّب.


الخصائص الفيزيائية للمُركَّبات الأيونية والتساهُميَّة

تُساعِدنا معرفتنا بكيفية ترابُط الذرّات لتكوين الأنواع المختلفة من المُركَّبات على فهم الاختلاف في الخصائص الفيزيائية للمواد. ويُبيّن الجدول (٢-٣) الاختلافات الكبيرة في خصائص المُركَّبات الأيونية والمُركَّبات التساهُميَّة البسيطة.

ويعتمد ما نلاحظه من اختلافات بين الخصائص الفيزيائية للمُركَّبات الأيونية والمُركَّبات التساهُميَّة البسيطة على قوى الترابُط بين جُسَيمات المُركَّب. فالأيونات التي تكوّن المُركَّب الأيوني تتماسك من خلال قوى التجاذب الكهروستاتيكي عبر كامل الترابُط الكيميائي، حيث تعمل

تلك القوى بمختلف الاتّجاهات في المُركَّب الصلب، وتُثبّت الأيونات بقوّة في أماكنها ضمن تركيبها الشبكي، وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع درجات انصهار ودرجات غليان المُركَّبات الأيونية. أما المُركَّبات التساهُمية فإنها تتشكَّل من جُزيئات، تربط فيما بينها قوى بين-جُزيئية ضعيفة، ممّا يجعل هذه المُركَّبات ذات درجات انصهار ودرجات غليان منخفضة. وهذا يعني أن الفصل بين جُزيئاتها يحتاج إلى طاقة أقلّ بكثير من الطاقة اللازمة لفصل الأيونات في المُركَّبات الأيونات في المُركَّبات الأيونات.

وكنا قد تحدّثنا في الوحدة الأولى عن ذوبانية المواد الصلبة في السوائل، وبينّا كيف تبدأ المادة الصلبة بالتفكُّك عند وضعها في سائل (الصورة ١-٣). تعتمد الذوبانية على خصوصية كل من المادّة الصلبة والسائل المعنيين بهذه العملية. على سبيل المثال، يُبيِّن الشكل (٤-١٣) كيف تُكوِّن جُزيئات الماء أغلفة حول أيونات الفلزّ (الكرات الصفراء)، وحول أيونات اللافلزّ (الكرات البيضاء)، وهو ما يُساعد على إذابة كثير من المواد الأيونية (مثل كلوريد الصوديوم، المحاد).



الشكل ٤-١٣ عملية إذابة كلوريد الصوديوم في الماء

السبب في امتلاكها هذه الخصائص	خصائص المُركّبات الأيونية
الترتيب المُنتظم للأيونات في الشبكة وتقارُب الأيونات المختَلفة الشحنات.	بلورية صُلبة عند درجة حرارة الغرفة.
التجاذُب القائم بين الأيونات بفضل قوى كهروستاتيكية شديدة وحاجتها إلى كمّيات كبيرة من الطاقة لينفصل بعضها عن بعض.	لها درجات انصهار وغليان مُرتفِعة، وهي ليست مُتطايِرة.
انجذاب الماء نحو الأيونات المشحونة، ممّا يساعد على فصل بعضها عن بعض، وبالتالي إذابة المُركَّب الأيوني.	غالبًا ما تذوب في الماء، (الشكل ٤-١٣)، (ولكنها لا تذوب في المُذيبات العضوية مثل الإيثانول وثلاثي كلوروميثان (الكلوروفورم) وميثيل البنزين.
لأن الأيونات حُرَّة الحركة في المصهور أو المحلول؛ الأمر الذي يمكِّن الأيونات من التحرِّك نحو الأقطاب	تصبح مُوصِّلة للكهرباء عندما تكون مُنصهِرة أو ذائبة في الماء (ولا تكون موصِّلة للكهرباء في حالتها الصلبة).
الكهربائية عند تعرُّضها لجهد كهربائي.	
الكهربانية عند تعرضها لجهد كهرباني. السبب في امتلاكها هذه الخصائص	خصائص المُركَّبات التساهُمية البسيطة
	خصائص المُركَّبات التساهُمية البسيطة غالبًا ما تكون سائلة أو غازيَّة عند درجة حرارة الغُرفة.
السبب في امتلاكها هذه الخصائص	
السبب في امتلاكها هذه الخصائص لأن قوى التجاذُب بين الجُزيئات ضعيفة. لأن القوى بين الجُزيئات (القوى بين-الجُزيئية) ضعيفة جدًا؛ وهي وبالتالي لا تحتاج إلى قدر كبير	غالبًا ما تكون سائلة أو غازيّة عند درجة حرارة الغُرفة.

الجدول ٤ـ٣ مُقارَنة بين خواص المُركّبات الأيونية والتساهُميَّة البسيطة

أسئلة

- ١٠-٤ كيف يوصِّل مصهور كلوريد الصوديوم الكهرباء؟
- **١١-٤** لماذا لا يوصِّل مُركَّب كلوريد الصوديوم الكهرباء في حالته الصلبة؟

نشاط ٤-٢

دراسة خصائص المُركَّبات التساهُميَّة والأيونية

المهارات:


- يُبين بطريقة عملية المعرفة المُتعلِّقة بكيفية
 الاستخدام الأمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - ينجز التجربة ويُسجّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يُناقش المُلاحظات التجريبية والبيانات ويُقيمها.

ستستقصي في هذا النشاط بعض خصائص المُركَّبات الأيونية والتساهُميَّة. سوف تدرس درجة الانصهار ودرجة الغليان والذوبانية والموصّلية لمُركَّبات مختلفة، لتحديد الخصائص العامّة للمُركَّبات التساهُميَّة والأيونية.


- كبريتات النحاس (۱۱) سامٌ والكلور أيضًا، وهو إحدى المواد الكيميائية الناتجة خلال التجرية.
 - ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - نفن التجرية في صندوق طرد الغازات أو مختبر جيد التهوئة.
 - اغسل يديك بعد الانتهاء من التجربة العملية

الطريقة

- ا فحص بواسطة عدسة مُكبِّرة عينة كلّ من المواد الكيميائية الخصائص التالية (صلب، سائل، غاز، لدن (لين)، قابل للطرق، بلوري، لامع). وسجِّل ملاحظاتك في جدول.
 - حدِّد، بالاستناد إلى معلوماتك وكتاب الطالب، نوع الترابُط الموجود في كل مادة كيميائية، وسجِّل ذلك في جدول.
 - " ضع كمّية صغيرة من كل مادة كيميائية في أنبوبة تسخين منفصلة. وقم بتسخين كل أنبوبة بشدّة فوق اللهب الأزرق لموقد بنزن (استخدم الجزء الأكثر سخونة من اللهب). ماذا تلاحظ؟ دوِّن هذه



- الملاحظات في جدول النتائج الخاصّ بك. حدِّد درجة الانصهار لكل مادة كعالية أو منخفضة.
 - ك ضع مقدار ملعقة كيماويات واحدة من كل مادة كيميائية في كؤوس منفصلة تحتوي ماء، وحرِّك المخلوط بواسطة ساق زجاجية. دوِّن ملاحظاتك وصنِّف المواد الكيميائية إلى مواد ذائبة في الماء أو غير ذائبة.
 - اختبر التوصيل الكهربائي للمواد الكيميائية الذائبة بواسطة المُعدّات المُبيّنة بشكل مفصّل في الرسم التوضيحي التالي.



 سجّل ملاحظاتك على التوصيل الكهربائي في جدول نتائجك.

315...1

- حدِّد الاتِّجاه العام لخاصَّيتي الجُزيئات التساهُميَّة الآتيتين:
 - أ. التوصيل الكهربائي ب. الذوبانية
- ٢ حدِّد الاتجاه العام لخصائص المواد الأيونية الآتية:
 - أ. درجة الانصهار
 - ب. التوصيل الكهربائي
 - ج. الذوبانية
- س يحتوي كلّ من شمع البارافين والكربون (الجرافيت) على روابط تساهُميَّة. يمتلك الشمع درجة انصهار منخفضة بينما يمتلك الكربون (الجرافيت) درجة انصهار مرتفعة. فسِّر ذلك.

٤-٣ البلُّورات


البلورات الأيونية

تُشكِّل المُركِّبات الأيونية شبكات مُكوَّنة من أيونات موجبة وأيونات سالبة. ففي الشبكة الأيونية، تحمل الأيونات القريبة المجاورة لأيون ما شحنة مُعاكسة لشحنته. ففي مُركَّب كلوريد الصوديوم مثلًا، يكون كل أيون صوديوم (Na⁺) مُحاطًا بستَّة أيونات كلوريد (CI⁻) مُحاطًا بستَّة أيونات كلوريد (CI⁻) مُحاطًا بستَّة أيونات ويكون أيضًا كل أيون كلوريد (CI⁻) مُحاطًا بستَّة أيونات

صوديوم ($^{+}$ Na). وبشكل عام تتساوى أعداد أيونات $^{+}$ Na وأعداد أيونات $^{-}$ Cl لذا تكون الشحنات مُتوازنة.

ويعتمد الترتيب الفعلي لأيونات المُركَّبات الأخرى على عدد الأيونات في المُركَّب وأحجامها. ومع ذلك يهمُّنا تذكُّر أن كل المُركِّبات الأيونية مُتعادلة كهربائيًّا.

ويكون التركيب الأيوني الضخم ويكون التركيب الأيوني الضخم مُترابطًا بفضل قوى التجاذُب الكهروستاتيكية الشديدة التي تنشأ بين الجُسيمات ذات الشحنات المُتعاكِسة (الشكل



الشكل ٤-٤ (أ) ترتيب الأيونات الموجبة والأيونات السالبة في بلّورة كلوريد الصوديوم. (ب) تكوُّن الشبكة الأيونية الضخمة لمُركّب كلوريد الصوديوم.

البلُّورات التساهُميَّة

توجد بعض العناصر اللافلزية (مثل اليود، والكبريت) وبعض المُركَّبات التساهُميَّة، في هيئة مواد صُلبة ذات درجات انصهار منخفضة. ففي تلك المواد تترابط جُزيئات العناصر أو جُزيئات المُركَّبات معًا بوساطة قوى بين-جُزيئية ضعيفة، لتشكِّل بلورات يسهل تفكيكها بالحرارة. وبعد ذلك تُصبح الجُزيئات حرّة الحركة، ولكنَّها على عكس جُسيمات البِلُورات الأيونية لا تحمل شحنة كهربائية ولا توصل الكهرباء.

البلّورات التساهُميّة الضخمة (الجُزيئات الكبيرة)

تتصف ذرّات بعض العناصر التي تتوسّط المجموعات الرئيسية، كالكربون والسيليكون بأنها لا تُشكِّل جُزيئات بسيطة فقط، بل يمكن أن تكون في هيئة تراكيب جُزيئية ضخمة مُترابطة بروابط تساهُميَّة أُحادية وتُنائية. في هذه التراكيب، تترابط الذرّات على هيئة شبكة واسعة، أو شبكة تساهُميَّة (جُزيئية) ضخمة (Giant covalent (molecular) ضخمة (attice) وتكون مثل هذه التراكيب قويّة جدًّا، لأن الذرّات جميعها مُترابطة بروابط تساهُميَّة قوية.

وتُعزى خصائص الماس (وهو أحد أشكال الكربون) إلى أن روابطه التساهُميَّة القوية تمتد في جميع الاتّجاهات عبر


كامل البلورة، حيث ترتبط كل ذرَّة كربون بأربع ذرّات كربون أخرى وتكون مُرتَّبة بشكل رُباعيِّ الأوجه (الشكل ٤-١٥). ويمتلك الماس درجة انصهار مُرتفعة جدًا. وبما أن الرابطة تمتد على كامل تركيبه البنائي، يكون الماس صلدًا جدًا، ويُستخدَم في صناعة أدوات القطع.

يتم في تلك التراكيب البنائية استخدام جميع الإلكترونات الخارجية للذرَّات لتشكيل روابط تساهُميَّة أحاديّة، ولا تكون هناك أي إلكترونات حُرَّة لكي تتحرّك. لذلك يُعدّ الماس عنصرًا لافلزيًا غير موصِّل للكهرباء.

وفي المقابل يُمثِّل الجرافيت نوعًا مختلفًا من الكربون، إذ تكون ذرَّات الكربون مُرتَّبة بطريقة مختلفة (عمّا هي في الماس) في التركيب الجُزيئي للجرافيت.

يكون ذلك الترتيب المُختلف على شكل طبقات مستوية (مُسطَّحة) سداسية الزوايا مُترابِطة (الشكل ٤-١٥٠ ب). وتُشكّل كل منها جُزَيئًا ضخمًا ثُنائيّ الأبعاد، وتكون كل ذرّة كربون داخل تلك الطبقات مرتبطة بثلاث ذرّات كربون أخرى بروابط تساهُميّة قوية ويبقى إلكترون واحد لكل ذرّة كربون يشارك في رابطة ثنائية (غير متمركزة delocalized). هذه الإلكترونات غير المتمركزة تتحرّك بحرّية داخل كل طبقة من طبقات الجرافيت (وليس بين طبقاته) مما يجعل الجرافيت موصلًا للكهرباء، وتكون قوى التجاذُب ضعيفة بين طبقات الجرافيت، ممّا يجعلها سهلة الانزلاق بعضها فوق بعض. وهذا يعنى أن الجرافيت زلق ويمكن استخدامه للتشحيم.

فقلم الرصاص مُكوّنَ في الواقع من الجرافيت. وعندما نكتب به تعلق طبقات رقيقة من الجرافيت على الورقة. ومع ذلك تبقى الخاصّية الأكثر تميُّزًا للجرافيت في الإلكترونات المُشاركة في الروابط التساهُمية الثنائية والموجودة في طبقات الجرافيت. ويبقى تحرُّك الإلكترونات غير المتمركزة «الحُرّة» محصورًا داخل كل طبقة حاملة معها الشحنات الكهربائية. ولهذا يمكن للجرافيت أن يوصّل الكهرباء بطريقة مُشابهة للفلزّات (الجدول ٤-٤).



الشكل ٤-١٥ (أ) التركيب البنائي الهرمي الرباعي الأوجه للماس، ولثنائي أكسيد السيليكون. (ب) التركيب البنائي الطبقي للجرافيت

يتشابه تركيب الماس وثنائي أكسيد السيليكون تشابهًا كبيرًا (الشكل ٤-١٥)، ممّا يعني تشابُه خصائصهما الفيزيائية، فكلاهما يمتلكان صلادة ودرجات انصهار مرتفعة. ويُعدّ الرمل والكوارتز مثالين على ثنائي أكسيد السيليكون (SiO₂)، حيث يكون تركيب ذرّات السيليكون والأكسجين بأكمله مُترابِطًا عبر الشبكة بواسطة روابط تساهُميَّة قوية.

تذكّر

من المهم أن تميّز بين تراكيب الماس والجرافيت عند عرض مُخطَّطاتهما التوضيحية. ومن المهم أيضًا أن تكون قادرًا على تفسير صلادة الماس استنادًا إلى الترابط القوي للتركيب الشبكي ثلاثيّ الأبعاد.

يرجع التوصيل الكهربائي للجرافيت إلى وجود إلكترونات (غير متمركزة) تكون قادرة على الحركة وحمل التيار الكهربائي.

ويمكن استخدام الجرافيت كمادة صُلبة للتشحيم، لأن طبقاته الجُزيئية ينزلق بعضها فوق بعض.

	الجرافيت	(الماسر	
الاستخدامات	الخصائص	الاستخدامات	الخصائص	
	لونه رمادي غامق وهو صلب لامع	المجوهرات وأدوات الزينة	عديم اللون، بلوري شفّاف يتألّق في الضوء	المظهر
أقلام الرصاص وكمادّة للتشحيم	أملس ويمكن للطبقات التي تُشكِّله أن تنزلق بعضها فوق بعض، وهو صلب ذو ملمس زلق	مُعدَّات الحَفَر والمناشير الماسيَّة وقاطعات الزجاج	أصلد مادة طبيعية	الصلادة
	أقلِّ كثافة من الماس (2.25 g/mL)		أكثر كثافة من الجرافيت (3.51 g/mL)	الكثافة
الأقطاب الكهربائية وفراشي المُحرِّكات الكهربائية	موصِّل للتيَّار الكهربائي		غير موصِّل للتيَّار الكهربائي	التوصيل الكهربائي

الجدول ٤-٤ خصائص واستخدامات كلّ من الماس والجرافيت

أسئلة

١٢-٤ لماذا يتميَّز الجرافيت بأنَّه:

أ. يوصِّل الكهرباء؟

ب. يُستخدَم للتشحيم؟

٤-١٣ لماذا يُعدّ الماس أكثر صلادة من الجرافيت؟

١٤-١٤ لماذا لا توصل البلورات الجُزيئية الكهرباء على الإطلاق؟

١٥-٤ ما وجه الشبه بين ثنائي اكسيد السيلكون والماس من حيث التركيب البنائي؟

ملخّص

ما يجب أن تعرفه:

- تتكون تراكيب كل المواد من ذرّات أو أيونات أو جُزيئات.
- تنقسم الروابط الكيميائية بين تراكيب المواد إلى نوعين:
 - الرابطة الأيونيّة
 - الرابطة التساهُميَّة
- تُعد قوى التجاذب الكهروستاتيكية الشديدة بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة أساس الرابطة الأيونية التي تتشكّل في المُركَّبات المُتكوِّنة بين الفلزّات واللافلزّات.
- تتشكَّل الرابطة التساهُمية في بعض المُركَّبات والعناصر اللافلزَّية، والتي تتضمن «التشارك» في الإلكترونات بين الذرّات لتشكّل جُزيئات مستقرّة.

- تُتج الرابطة التساهُمية نوعَيْن من التراكيب البنائية، هما الجُزيئات البسيطة والجُزيئات الضخمة (الجُزيئات الكبيرة).
- تعتمد الخصائص الفيزيائية لمادة ما على نوع الرابطة الموجودة فيها.
 - الماس والجرافيت شكلان مختلفان للكريون يمتلكان
 تراكيب تساهُميَّة ضخمة مختلفة، ولهما خصائص
 مختلفة بشكل واضح.

أسئلة نهاية الوحدة

١ زاوج كُلاًّ من المصطلحات المُدرجة في العمود الأيمن مع التعريف الخاص به في العمود الأيسر:


أيون ذرّتان أو عدّة ذرّات مُترابِطة بروابط تساهُميَّة.

قوة تجاذب كهروستاتيكية شديدة بين أيونَيْن يحملان شحنتين متعاكستين.

رابطة تساهُميَّة أحادية جُسَيم فقد أو اكتسب إلكترونات.

زوج إلكترونات مُشتَرك بين نواتَين.

٢ يبيِّن الشكل الآتي المُخطَّط النقطي لمُركَّب كلوريد الصوديوم.



أ. اذكر نوع الرابطة في هذا المُركَّب.

ب. ما نوع التركيب البنائي لهذا المُركَّب؟

ج. استنتج صيغته.

رابطة أيونية

د. حدِّد الحالتَيْن اللتين يكون هذا المُركَّب فيهما موصِّلاً للكهرباء.

٣ يبيِّن الشكل الآتي الصيغة الشائعة لمُركَّب الميثان.




أ. اذكر نوع الرابطة في هذا المُركَّب.

ب. ما نوع التركيب البنائي لهذا المُركَّب؟


ج. اكتب صيغته.

د. فسّر: يمتلك هذا المُركَّب درجتَى انصهار وغليان منخفضتين نسبيًّا.

عُ يُبِيِّن الشَّكل أدناه المُخطَّط النقطي لكل من ذرَّتي الهيدروجين والكلور.



- أ. حدّد الدورة التي ينتمي إليها الهيدروجين في الجدول الدوري.
- ب. فسّر: تم وضع الكلور في المجموعة VII من الجدول الدوري.
- ج. ارسم المخطط النقطي للمُركَّب الناتج من تفاعُل الهيدروجين والكلور.
 - و يبيِّن الشكل الآتي التركيب الإلكتروني لذرَّتَيُّ عُنصرَين.



- أ. ما اسمُ العنصر (A)؟
- ب. ما رمز العنصر (B)؟
- ج. اشرح باستخدام المُخطُّط النقطي كيف يتكوّن مُركَّب من هذَين العُنصرين.
 - د. يمتلك هذا المُركُّب درجة انصهار مرتفعة. فسِّر ذلك.
 - 🕇 يتكوّن الرمل بشكل رئيسي من ثُنائي أكسيد السيليكون.
 - أ. ما صيغة ثُنائى أكسيد السيليكون؟
 - ب. صف التركيب البنائي لثنائي أكسيد السيليكون.
- ج. لماذا لا يمكن لثُنائى أكسيد السيليكون أن يوصّل الكهرباء في أي حالة فيزيائية.
 - الكربون عُنصر ينتمى إلى المجموعة ١٧ من الجدول الدوري.
 - أ. ما الرابطة التي تتشكّل بين ذرّات عُنصر الكربون؟
 - ب. يستخدم الماس في قطع الفولاذ. فسر ذلك.
- ج. تُضاف طبقة من الجرافيت في أسفل السفن عند إنزالها إلى الماء. فسر ذلك.



الوحدة الخامسة

معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة Rate of Reaction and Energy Changes

تُغطّي هذه الوحدة:

- مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي
 - اختيار الأدوات والأجهزة
- العوامل المؤثرة في مُعدّل سرعة التفاعُل:
 - مساحة سطح المواد المُتفاعلة
 - تركيز المواد المُتفاعِلة
 - درجة الحرارة
 - العامل الحفّاز
 - نظریة التصادُم
 - طاقة التنشيط
- تغيُّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية

ه-١ مُعدّل سرعة التفاعُل الكيميائي

يعرّف مُعدّل سرعة التفاعُل Reaction rate بأنه نسبة التغيّر الذي يحدث في كمّية إحدى المواد المُتفاعِلة أو الناتجة خلال مُدَّة زمنية مُعيّنة. فمثلًا لا بد أنك تعلم بأن السرعة هي مُعدَّل المسافة المقطوعة في مدة زمنية مُحدَّدة، وكذلك في الكيمياء، يكون من المفيد أيضًا معرفة


المُدَّة الزمنية التي يستغرقها كل تفاعُل. ويتمّ حساب مُعدَّل سرعة التفاعل الكيميائي من خلال حساب مُعدَّل استهلاك إحدى المواد المتفاعلة أو تكوّن إحدى المواد الناتجة في مدة زمنية محددة. وغالبًا ما يتمُ التعبير عن ذلك بمُعادلة تظهر نسبة تغيّر كمّية مادة مُتفاعلة أو ناتجة بمرور الزمن.

مُعدّل سرعة التفاعُل =

تغيّر كمّية مادة مُتفاعِلة (أو مادة ناتجة) التغيّر في الزمن

فمثلا يعتبر صدأ الحديد نموذجًا واقعيًا لنوعية التفاعلات التي يكون مُعدَّل سرعة التفاعل فيها بطيئًا جدًّا ويستغرق مدة زمنية طويلة نسبيًّا للحدوث، إذ يمكن لفلز الحديد المستخدم في المباني والسيّارات والسفن أن يتفاعل مع الأكسجين والماء الموجودين في محيطه، وتكوين مُركّب أكسيد الحديد المائي (الصدأ). ويمكن لهذه العملية أن تستغرق أيامًا أو شهورًا أو سنوات.

في حين يُعدّ تحضير الخبز في الفرن مثالاً على تفاعُل ذي مُعدَّل سرعة تفاعُل متوسِّطة. إذ تتفاعل كربونات الصوديوم الهيدروجينية مع الأحماض الموجودة في العجين قبل وأثناء خبزه وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون. ما يسمح للعجين وللخبز بالانتفاخ في غضون ساعة. وفي المقابل قد تتفاعل بعض الفلزّات، كالماغنيسيوم، بسرعة كبيرة جدًا عند إشعالها في الهواء الطلق، حيث يمكن أن ينتهي التفاعُل في غضون ثوان قليلة. تُبيِّن الصورة (٥-١) اشتعالاً لافتًا لمسحوق مخلوط الماغنيسيوم والألومنيوم (شمعة سحرية).



الصورة ٥-١ اشتعال لافت لمسحوق مخلوط الماغنيسيوم والألومنيوم في الهواء

يعتمد مُعدّل سرعة التفاعُل على الظروف التي يحدث بها التفاعُل وعلى طبيعة المواد المشاركة فيه. ولعلك سمعت عن حرائق مناجم الفحم، والتي يكون سببها الرئيسي غاز الميثان الذي يتسرّب من باطن الأرض عبر الشقوق. لكن

ما يؤدي فعليًّا إلى ازدياد حرائق هذه المناجم هو غبار الفحم المتطاير أثناء عملية التنقيب، لذا يجب تهوئة مناجم الفحم بشكل جيد لمنع حدوث أي انفجار. إذ يمكن لعمليات التعدين أن تحرّر بعض الرواسب الطبيعية التي تحتوي على غاز الميثان. وعندما يختلط هذا الغاز مع الهواء، يمكن لشرارة صغيرة أن تتسبب بحدوث انفجار تكون عواقبه مدمرة على المنجم والعمال. وكذلك الحال بالنسبة لمصانع الدقيق والشعير، فغبار الدقيق يعمل على زيادة اشتعال الحرائق وزيادة مُعدّل الانفجارات المصاحبة لها (الصورة ٥-٢).



الصورة 2-0 كرة نارية ناتجة عن إسقاط دقيق القمح على لهب مشتعل

لكن في المقابل تعتبر امكانية التغيير أو التحكم بمُعدَّل حدوث سرعة التفاعل الكيميائي من الأمور المفيدة جدًا لا سيما في نطاق الصناعات الكيميائية. فعلى سبيل المثال، تقوم بعض المحطَّات الحديثة لتوليد الطاقة، العاملة على الفحم، بحرق الفحم المسحوق بدلًا عن كتل الفحم المستخدمة عادة لأن الفحم المسحوق يحترق بفاعلية أكبر.

أسئلة

- ١-٥ احسب مُعدّل سرعة التفاعُل لكل من التفاعُلات الآتية:
 أ. تفاعُل ينتج 60 mL من غاز الهيدروجين في 20 s.
- ب. تفاعُل يستهلك g 1.55 من ثاني أكسيد الكربون في 3.5 min
 - ضمّن إجاباتك وحدات (units) متغيّرات التفاعُلات.

اختيار الأدوات والأجهزة للتجارب

من الضروري عند إجراء التجارب العملية، اختيار الأدوات والأجهزة المناسبة لكل تجربة؛ بحيث توفر الدَقة المطلوبة أثناء القياس. وينبغي أن يكون الجهاز المستخدم لقياس مُتغيّر ما تتم متابعته قادرًا على إعطاء نتائج دقيقة.

قياس الزمن: تُستخدم ساعة الإيقاف لتحديد الزمن اللازم لحدوث تفاعُل مُعيَّن، ومن ثم دراسة مُعدَّل سرعة ذلك التفاعُل. وتعطي ساعات الإيقاف الرقمية قراءات دقيقة تصل إلى أجزاء من الثانية.

قياس الكتلة: يُستخدَم الميزان لقياس كتل المواد. وتوفّر الموازين الرقمية قراءات حتى منزلتين عشريَّتين. وهي ملائمة وسهلة الاستخدام، ويجب ضبط الميزان على الصفر عند وضع الوعاء الفارغ على الميزان (وهو ما يُسمّى "وزن الفراغ" (taring).

قياس درجة الحرارة: يتم قياس درجات الحرارة خلال التطبيقات العملية باعتماد وحدة درجة الحرارة السيليزية (°C). ويعطي ميزان الحرارة قراءات ذات دقة تصل لنصف درجة إلى درجة سيليزية واحدة. وقد أصبحت موازين الحرارة الرقمية أيضًا متوفرة.

قياس الحجوم: عند قياس حجوم السوائل، من المُهمّ معرفة مستوى الدقّة المطلوبة لتجربة مُعيَّنة. وغالبًا ما يوفّر المخبار المدرج دفّة كافية، لقياس كمّيات كبيرة من المحاليل. ولكنها لا تكون بدقّة الماصّات أو السحاحات لقياس حجم أي سائل. وتُعدّ الماصّات الوسيلة الأكثر دفّة لقياس حجم ثابت (عادة الله 10 أو 25 mL). في حين تمثل السحاحات الأداة الأكثر دفّة لقياس حجم مُتغيِّر (يكون هذا الحجم عادة بين الله 0 و 10 mL). تُستخدَم السحاحات والماصّات كأدوات خلال عمليات المُعايرة، وإذا كنا بحاجة إلى تحضير محلول ذي تركيز مُعيَّن فإن الدورق الحجمي هو الوعاء المُناسب لتحضير هذا المحلول.

وفي بعض التجارب المُستخدَمة لدراسة التفاعُلات الكيميائية، يكون ضروريًا قياس حجم غاز ناتج. وفي هذه الحالة، يكون محقن الغاز الخيار الأمثل. كما يمكن استخدام مخبار مدرج مقلوب لتحقيق هذا الغرض، لجمع الغاز فوق الماء. مع التنويه على عدم اعتماد هذه الطريقة إذا كان الغاز ذائبًا في الماء؛ ويوضح الشكل (٥-١) بعض الأدوات المخبرية الشائعة.



ه-٢ العوامل المُؤثِّرة في مُعدِّل سرعة التفاعُل

تحدث التفاعُلات المتفجّرة بلمح البصر، في حين أن بعض التفاعُلات، مثل الصدأ، تحدث في فترات زمنية طويلة. حيث يختلف مُعدّل سرعة التفاعُلات تبعًا لعوامل مختلفة. فما هي العوامل التي تؤثّر في مُعدّل سرعة التفاعُل؟ أظهرت نتائج العديد من الدراسات على مجموعة كبيرة من التفاعُلات أن هناك أربعة عوامل رئيسية تؤثر على مُعدّل سرعة التفاعُل وهي:

- مساحة سطح Surface area المواد المُتفاعِلة الصُّلبة
 - تركيز Concentration المواد المتفاعلة
- درجة الحرارة Temperature التي يحدث عندها التفاعُل
 - استخدام عامل حفّاز Catalyst

تأثير مساحة سطح المواد المُتفاعِلة الصَّلبة على مُعدَّل سرعة التفاعُل

كلما كان مسحوق المادة المُتفاعلة الصُّلبة ناعمًا كان مُعدَّل سرعة تفاعُلها أعلى، لأن تفاعُلات المواد الصُّلبة تحدث على سطوحها. وعليه، فإن المادة الصلبة كمسحوق تمتلك مساحة سطح أكبر بكثير مما لو كانت قطعًا كبيرة.


على سبيل المثال، غالبًا ما يكون من الصعب حرق جذع كبير من الخشب، ولكن إذا تم تقطيعه إلى قطع أصغر فيمكن حرقه بسهولة أكبر. ذلك أن قطع الخشب الصغيرة تمتلك مساحة سطح أكبر مقارنة بالجذع. إن امتلاك مساحة سطح كبيرة يعني أن المزيد من سطح المادة الصلبة سيكون مكشوفًا ويمكن أن يتفاعل. مثال آخر على تأثير مساحة السطح على مُعدّل سرعة التفاعُل هو الخطر الذي يُمثِّله غبار الطحين في المطحنة. لا تحترق عبوة الطحين بسهولة، لكن جُسيمات غبار الطحين تمتلك مساحة سطح كبيرة على تماس مباشر مع الهواء، لذا تكفي مساحة بسيطة لإحداث تفاعُل مُتفجِّر.

وعند تفاعُل مادتين صُلبتين فإن سحقهما يعني إمكانية خلطهما بشكل أفضل. فالمساحيق المخلوطة معًا ستكون على تماس مباشر ويمكنها أن تتفاعل بصورة أسرع.

وكذلك في حال تفاعُل المادّة الصُّلبة والمادة السائلة (أو المحلول)، يكون التماسّ بين المواد المُتفاعلة أكبر عندما تكون مساحة المادة الصلبة أكبر. ويعتبر التفاعُل بين الحجر الجيري أو قطع الرخام (وهما شكلان لكربونات الكالسيوم) مع حمض الهيدروكلوريك المُخفَّف مثالًا على ما سبق:


حمض الهيدروكلوريك + كربونات الكالسيوم \rightarrow ثانى أكسيد الكربون + ماء + كلوريد الكالسيوم

 $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ويمكن إجراء التجربة كما هو مُبيّن في (الشكل ٢-٥).



الشكل ٥-٢ الأدوات والأجهزة في التجربتين A وB: تفاعُل قطع الرخام مع حمض الهيدروكلوريك المُخفَّف. يؤدي تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من التفاعُل إلى نقصان كتلة الدورق التي يتم قياسها باستخدام ميزان رقمي

ونستطيع باستخدام هذا الجهاز مقارنة عينتين من قطع الرخام لهما الكتلة نفسها، حيث تكون قطع العينة B أصغر من قطع العينة A. ويتم تنفيذ التجربة مرتين: مرة مع العينة A، ومرة مع العينة B. وفي كلتا التجربتين يكون مع العينة A، ومرة مع العينة B. وفي كلتا التجربتين يكون حجم وتركيز حمض الهيدروكلوريك نفسه. يوضع الدورق على الميزان أثناء التفاعُل، ويتم وضع سدادة من الصوف القطني على فوهة الدورق لتمنع تسرُّب رذاذ السائل ولتسمح بخروج غاز ثاني أكسيد الكربون من الدورق. وهذا يعني أن الدورق سيفقد جزءًا من كتلة محتوياته وهذا يعني أن الدورق سيفقد جزءًا من كتلة محتوياته أثناء التفاعُل. ويتم أخذ قراءات الميزان على فترات زمنية منتظمة لتتبع النقص في الكتلة خلال التجربة.




الشكل ٥-٣ يوضِّح الرسم البياني النقص في الكتلة بمرور الزمن للتجربتين A وB

ويوضح الشكل ٥-٣ التدرج في تناقص كتلة المواد المُتفاعِلة في كلتا التجربتين A و B.

نعرض فيما يلي لنقطتين مهمّتين تتعلقان بالتمثيل البياني وهما:

• يكون مُعدّل سرعة التفاعُل أكبر في البداية. وهو ما تظهره حدّة ميّل المُنحنيين صعودًا خلال الدقائق الأولى للتفاعُل. ويكون المنحنى B أكثر مَيلًا من المنحنى A. وهذا يعني أن غاز (CO₂) يتم إنتاجه بشكل أسرع في العيّنة B. فالعيّنة التي تحتوي على قطع أصغر والتي تمتلك بالتالي مساحة سطح أكبر تتفاعَل بمعدَّل سرعة أكبر. كما يُظهر التمثيل البياني تباطؤ كلا التفاعُلين مع استهلاك المواد المُتفاعِلة حيث يصبح المنحنى أقلّ ميلاً (الشكل ٥-٤).

• يكون الحجم الكلّي للغاز المُنطلق في كلتا التجربتين هو نفسه، كذلك يكون مُعدّل استهلاك المواد المُتفاعلة نفسه. وعند انتهاء التفاعُل في كلتا التجربتين مع استهلاك جميع المواد المُتفاعلة سيتوقف إنتاج الغاز في النهاية ويصبح كلا المنحنيين مسطَّحًا أفقيًا، ولكن العيّنة B ستبلغ الجزء الأفقى من المنحنى أوّلًا. تصف



الشكل ٥-٤ يكون التفاعُل أسرع في البداية، ثم يتباطأ نتيجة لاستهلاك المواد المُتفاعِلة

تذكّر

من المهم أن تفهم كيف تُفسَّر الأجزاء المختلفة للتمثيلات البيانية التي تم الحصول عليها.

هذه التجرية استخدامات الميزان الرقمي لدراسة مُعدَّل سرعة تفاعُل يُنتج غازًا. وهناك أيضًا طرائق أخرى لتقييم سرعة إنتاج الغاز (نشاط ٥-١). سوف نناقش لاحقًا طرائق جمع الغازات (خاصة باستخدام محقن الغاز) والتي يمكن استخدامها لقياس حجم الغاز الناتج خلال التفاعُل بمرور الزمن.

تبيّن هذه النتائج:

أنّ مُعدَّل سرعة التفاعُل يزداد عندما تزيد مساحة سطح Surface area المادة المُتفاعلة الصلبة.

نشاط ٥-١

معدُّل سرعة التفاعُل ومساحة السطح وتتبُّع سرعة إنتاج الغاز


المهارات:

- يبين بطريقة عملية المعرفة المتعلقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - ينجز التجربة ويسجِّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويقيّمها.
 - يقيم الطرق ويقترح التحسينات المحتملة.

يهدف هذا النشاط إلى استقصاء تأثير التغيُّر في مساحة سطح التفاعُل على مُعدَّل سرعة التفاعُل. وكيف سيؤثر الاختلاف في مساحة سطح قطع الرخام المُستخدَمة على مُعدَّل التفاعُل مع حمض الهيدروكلوريك.

- ضع النظارة الواقية (لحماية عينيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- تعامل مح حمض الهيدروكلويك بحذر لأنه مادة مُهيّجة للعينين والجلد والجهاز التنفُّسي ومسبّبة للتآكل.

الطريقة



- قم بإعداد الجهاز كما هو مُوضَّح في الرسم التوضيحي.
 ثبِّت أنبوبة الاختبار بواسطة مشبك وحامل معدني.
- (أن حوالي g 5 من كل مجموعة من قطع الرخام على أوراق ترشيح. استخدم تقريبًا الكتلة نفسها (قدر المستطاع) من العينات الثلاث.
 - ضع القطع الكبيرة داخل أنبوبة الاختبار. ثم أضف 15 mL من محلول حمض الهيدروكلوريك إلى أنبوبة الاختبار. أغلق فوهة الأنبوية بواسطة السدادة وابدأ التوقيت على الفور. احسب عدد الفُقاعات المتصاعدة خلال دقيقة واحدة، وسجِّل النتيجة ضمن جدول معتمدًا العناوين التالية: «حجم قطع الرخام» و «عدد فقاعات الغاز المُنبعثة خلال 60 ثانية» لأعمدة الجدول.
 - كرر الخطوة ٣ للعينتين الأُخريين من قطع الرخام وسجِّل النتائج أيضًا.

أسئلة

- ١ اكتب المُعادلة اللفظية لهذا التفاعُل.
- اشرح كيف يتغيَّر مُعدَّل سرعة التفاعُل بتغيُّر مساحة سطح المادة الصلبة المُتفاعلة.
- ۳ اقترح طرائق تجعل هذه التجربة أكثر موثوقية ولكن من دون تغيير الجهاز.
- اقترح طريقة أخرى لقياس مُعدَّل سرعة هذا التفاعُل، تتضمَّن جمع الغاز. خطط تجربة وأنجزها باستخدام جهاز متوفر في مختبر مدرستك.
- ما الاختبار الذي يمكن استخدامه للكشف عن وجود ثاني أكسيد الكربون؟ كيف تعدِّل الجهاز كي يشمل تجربة اختبار وجود غاز ثاني أكسيد الكربون؟


تأثير تركيز المواد المُتفاعِلة على مُعدّل سرعة التفاعُل

تُفيد التفاعُلات المُنتجة لمواد غازية في دراسة تأثير تركيز المحلول على مُعدَّل التفاعُل. ويمكن تعديل التفاعُل بين قطع الرخام والحمض لهذه الغاية. وهناك تفاعُل آخر يمكن استخدامه وهو التفاعُل بين الماغنيسيوم وكمية فائضة من حمض الهيدروكلوريك المُخفَّف:

→ حمض الهيدروكلوريك + ماغنيسيوم
 هيدروجين + كلوريد الماغنيسيوم


$$Mg(s) + 2HCI(aq) \rightarrow MgCI_2(aq) + H_2(g)$$

يُظهر (الشكل ٥-٥) الأدوات والأجهزة اللازمة لهذه التجربة. وسنقارن بين تجربتين مُختلفتين نسميهما C و D. سيكون تركيز الحمض في تركيز الحمض في التجربة D. وعدا تغيّر تركيز الحمض تبقى كل المُتغيّرات الأخرى ثابتة أي إن حجم الحمض ودرجة الحرارة وكتلة الماغنيسيوم المُستخدَمة يجب أن تكون هي نفسها في كلتا التجربتين. وسيُجمع غاز الهيدروجين الناتج من هذا التفاعل في محقن غاز ويقاس حجمه خلال فترات زمنية متكرِّرة.



الشكل ٥-٥ الأدوات والأجهزة اللازمة للتجربتين C و D: تفاعُل الماغنيسيوم مع كمية فائضة من حمض الهيدروكلوريك المخفّف حيث يجمع غاز الهيدروجين الناتج ويقاس حجمه بوساطة محقن الغاز

ويمكننا بعد ذلك رسم تمثيل بياني يُظهِر حجم الغاز الذي تم جمعه بمرور الزمن. (الشكل ٥-٦).



الشكل ٥-٦ يُظهِر التمثيل البياني حجم غاز الهيدروجين مقابل الزمن للتجربتين C و D. ويكون معدَّل التفاعُل أسرع عندما يكون محلول الحمض أكثر تركيزًا (المنحني C)

ومرّة أخرى يُظهر التمثيل البياني بعض النقاط المهمة:

- يكون منحنى التجربة C أكثر مَيلًا صعودًا مما هو عليه في التجربة D. وهذا يُبيّن بوضوح أن التفاعُل C الذي يستخدم حمضًا تركيزه أكبر يكون مُعدّل سرعته أعلى من التفاعُل D.
- يبدأ منحنى التجربة C بميل صاعد يساوي ضعفي الميل الصاعد لمنحنى التجربة D. وهذا يعني أن مُعدَّل سرعة سرعة التفاعُل في C يساوي ضعفي مُعدَّل سرعة التفاعُل في D في البداية. وبالتالي فإن مضاعفة تركيز الحمض تضاعف مُعدَّل سرعة التفاعُل.
- سيكون الحجم الكلّي لغاز الهيدروجين الناتج متساويًا في كلتا التجربتين، على الرغم من أن التجربة C تُنتج هذا الغاز بشكل أسرع؛ ذلك أن كتلة الماغنيسيوم وكمّية الحمض هي نفسها في كلتا الحالتين.

تبيّن هذه النتائج: يزداد مُعدَّل سرعة التفاعُل عندما يزداد تركيز Concentration المادة المُتفاعِلة في المحلول.

نشاط ٥-٢

تأثير التركيز على مُعدَّل سرعة التفاعُل

المهارات:

- يبين بطريقة عملية المعرفة المُتعلِّقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها
 اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
- ينجز التجربة ويسجِّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويقيّمها.

يتفاعل ثيوكبريتات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك لتكوين الكبريت وفقًا للمعادلة الآتية:

 $Na_2S_2O_3(aq) + 2HCI(aq) \rightarrow$

 $SO_2(aq) + S(s) + H_2O(l) + 2NaCl(aq)$

يترسّب الكبريت في المحلول الذي يصبح نتيجة لذلك مُعتمًا (غير شفّاف).

• يهدف هذا النشاط إلى استقصاء تأثير التركيز على معدّل سرعة التفاعُل بين ثيوكبريتات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك المُخفّف. حيث يُقاس معدَّل سرعة التفاعُل عن طريق زمن اختفاء العلامة، الموضوعة تحت أوعية التفاعُل. تختفي العلامة نتيجة تكوُّن راسب الكبريت الناتج من التفاعُل.

- ضع النظّارة الواقية (لحماية عينَيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- تعامل مع حمض الهيدروكلوريك (1 mol/L) بحذر لأنّه مادة مُهيّجة للعينين والجلد والجهاز التنفسي ومسببة للتآكل.
 - قم بإجراء التجربة في مكان جيد التهوئة في المختبر لتجنب استنشاق الأبخرة.
 - تخلص من مخلوط التفاعل في المغسلة بإضافة الكثير من الماء فور انتهاء التجربة.

الطريقة

ارسم علامة تقاطع X على ورقة بيضاء.

- قس mL من محلول ثيوكبريتات الصوديوم وأضفها
 إلى الكأس وضعها على العلامة X.
- أضف mL من حمض الهيدروكلوريك، وبالتزامن ابدأ التوقيت.
- عاين الكأس مُباشرةً من الأعلى، ودوّن الزمن المُستغرَق «لاختفاء» العلامة X الموجودة على الورقة، أي الزمن اللازم لاختفاء العلامة نتيجة ترسُّب الكبريت.
- كرِّر التجربة باستخدام تراكيز مختلفة من ثيوكبريتات الصوديوم. انظر الجدول أدناه الذي يتضمن مُقترحات للتغيُّرات في الحجم.
 - حضًر جدولًا يحتوي على جميع نتائجك وسجًل
 بياناتك مباشرةً في الجدول.

تراكيز المحاليل	الزمن (s)	حجم (HCI/mL)	حجم الماء المُقطر (mL)	حجم ثيوكبريتات الصوديوم (mL)
		5	0	50
		5	10	40
		5	20	30
		5	30	20
		5	40	10

عرضالنتائج

ارسم تمثيلاً بيانياً يظهر تركيز ثيوكبريتات الصوديوم (a) على المحور السيني (x)، والزمن (a) الذي استغرقه حتى يختفي، على المحور الصادي (y)

أسئلة تقييم النتائج

- ا ماذا حدث عند إضافة الحمض إلى محلول ثيوكبريتات الصوديوم؟
 - Y باستخدام التمثيل البياني لنتائجك، اذكر تأثير زيادة تركيز ثيوكبريتات الصوديوم على معدل التفاعل.
 - ٣ اشرح كيف يمكن تحسين دقة وموثوقية التجربة.

ولدراسة تأثير درجة الحرارة على معدل سرعة التفاعل، سنستخدم تفاعل محلول ثيوكبريتات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك الذي يكون راسبًا أصفر من الكبريت.

→ حمض الهيدروكلوريك + ثيوكبريتات الصوديوم ماء + ثنائي أكسيد الكبريت + كبريت + كلوريد الصوديوم


 $Na_2S_2O_3(aq) + 2HCI(aq)$

 \rightarrow 2NaCl(aq) + S(s) + SO₂(g) + H₂O(l)

نستطيع التحكَّم في مُعدَّل سرعة التفاعُل بتغيير درجة حرارة المواد المُتفاعِلة، ولهذا نعمد إلى وضع الأطعمة في البراد لحفظها إذ يكون مُعدَّل سرعة تفاعُلات التحلُّل والأكسدة أبطأ عند درجات الحرارة المُنخفِضة.

في هذه التجربة (E) يمكن الاستدلال بمُعدّل سرعة تكوّن راسب الكبريت على مُعدّل سرعة التفاعُل (الشكل 0-V)، حيث وُضعت علامة تقاطع \times على ورقة بيضاء ووُضع فوقها دورق يحتوي على محلول ثيوكبريتات الصوديوم، وأضيف حمض الهيدروكلوريك بسرعة (أ). والآن سيكون راسب الكبريت الأصفر المُتكوِّن باهتًا بحيث يبقى مُعلَّقًا في السائل. ومع مرور الزمن وتكوُّن المزيد من الكبريت يصبح السائل عكرًا، حيث تصبح الرؤية من خلاله أكثر صعوبة. ويتمّ قياس الزمن اللازم "لاختفاء" علامة التقاطع \times (ν).

فكلّما كان مُعدَّل سرعة التفاعُل أكبر يقلّ الزمن الذي تكون فيه العلامة × مرئية. ويُعاد بعد ذلك تنفيذ هذه التجربة








الشكل ٥-٧ الأدوات اللازمة للتجربة (E): التفاعُل بين حمض الهيدروكلوريك وثيوكبريتات الصوديوم

عدة مرّات باستخدام محاليل تم تسخينها مسبقًا عند درجات حرارة مختلفة؛ على أن تبقى المحاليل وظروف التجربة هي نفسها ما عدا درجة الحرارة التي يتمّ تغييرها. وبعد ذلك يُرسم تمثيل بياني للزمن اللازم لاختفاء علامة \times مقابل درجة الحرارة، شبيه بالتمثيل المُبيَّن في الشكل (0-1).

يُبِيِّن التمثيل البياني ، نقطتين مهمتين هما:

- أنّ علامة × تختفي بشكل أسرع عند درجات الحرارة المرتفعة. فكلما كان الزمن اللازم لاختفاء هذه العلامة أقصر كان مُعدَّل سرعة التفاعُل أكبر.
 - أنّ الرسم البياني منحنى وليس خطًا مستقيمًا.



الشكل ٥ـ٨ التمثيل البياني للتجربة E. بارتفاع درجة الحرارة يقلّ الزمن اللازم لاختفاء علامة ×.

تذكر

من المهم أن ندرك في هذه التجربة أنه كلما كان الزمن اللازم لاختفاء العلامة X أقصر كان التفاعُل أسرع.

تبيّن نتائج هذه التجربة أنّ مُعدَّل سرعة التفاعُل يزداد عندما ترتفع درجة حرارة Temperature المخلوط المُتفاعل.

أسئلة

- ٢-٥ ماذا يحدث لمُعَدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي عند إجراء التغييرات الآتية:
 - أ. رفع درجة الحرارة.
- ب. زيادة مساحة سطح المادة المُتفاعِلة الصلبة.
 - ج. زيادة تركيز محلول مادة مُتفاعلة.
 - ٥-٣ لماذا يُحفظ الطعام القابل للفساد في البرّاد؟
- 4-8 في تفاعل ما، في أي لحظة يكون مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي في أعلى حالاته؟
- •-• لماذا يقل معدل سرعة التفاعُل الكيميائي مع مرور الزمن؟

تأثير العامل الحفّاز على مُعدّل سرعة التفاعُل تفكُّك فوق أكسيد الهيدروجين (بيروكسيد الهيدروجين)

فوق أكسيد الهيدروجين سائل عديم اللون صيغته الكيميائية H_2O_2 ، وهو عامل مؤكسِد قوي جدًّا. وعندما يتفكَّك يكوِّن الماء والأكسجين:

أكسجين + ماء \leftarrow فوق أكسيد الهيدروجين $2H_2O_2(I) \rightarrow 2H_2O(I) + O_2(g)$

ويمكننا تتبُّع مُعدَّل سرعة هذا التفاعُل من خلال جمع الأكسجين الناتج عنه في محقن غاز. ومن المعروف أن تفكُّك فوق أكسيد الهيدروجين وتكوِّن غاز الأكسجين يكون بطيئًا جدًا عند درجة حرارة الغرفة. غير أن إضافة و 0.5 من مسحوق أكسيد المنغنيز (١٧) ((MnO₂) تجعل التفاعُل يحدث بمعدَّل سرعة أكبر (التجربة (F)). وسوف نلاحظ أن المسحوق الأسود لا يختفي خلال التفاعُل (الشكل م-٩). إذا تم ترشيحه وتجفيفه في نهاية التفاعُل فإن كتلة المسحوق ستبقى هي نفسها (g 5.0).

لذا نقول إن أكسيد المنغنيز (١٧) هو عامل حضّاز Catalyst لفذا التفاعُل.

نشاط ٥-٣

العوامل المؤثرة على مُعدَّل سرعة التفاعُل

المهارات:

- يبين بطريقة عملية المعرفة المتعلقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها
 اتباع سلسلة من التعليمات المناسبة).
 - يخطُط للتجارب والاستقصاءات.
 - ينجز التجربة ويسجل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يناقش الملاحظات التجريبية والبيانات ويقيّمها.
 - يقيِّم الطرائق ويقترح التحسينات المحتملة.

يجب عليك في هذا النشاط أن تخطِّط وتكتشف كيف يمكن لعامل من العوامل المُختارة أن يُؤثِّر على مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي الآتي:

 $Mg + H_2SO_4 \longrightarrow MgSO_4 + H_2$


- ضع النظّارة الواقية (لحماية عينيك).
 - ارتد معطف المختبر.
- تعامل مح حمض الكبريتيك بحذر لأنّه مادة مُهيّجة للعينين والجلد والجهاز التنفسى ومسببة للتآكل.


الطريقة

- ا انقل حجم 10 mL من محلول حمض الكبريتيك تركيزه 2 mol/L
- أضف قطعة من شريط ماغنيسيوم طولها 5 cm إلى
 أنبوبة الاختبار، وشغل ساعة الإيقاف.
 - ت عندما يتوقّف التفاعُل سجِّل الزمن الذي استغرقه التفاعُل.
 - اذكر العوامل التي يُمكنُها أن تزيد مُعدّل سرعة التفاعُل أو تُقلله.
- اختر أحد هذه العوامل، ثم خطِّط استقصاءً لتكتشف كيف يؤثّر هذا العامل على مُعدّل سرعة التفاعُل.
- يجب أن يُعطي الاستقصاء الخاص بك نتائج كافية
 تجعلك قادرًا على رسم تمثيلًا بيانيًا يوضح أثر العامل
 على مُعدّل سرعة التفاعُل.

215.1

- ا أنجز الاستقصاء، وعلِّق على أي صعوبات قد تواجهها، وكيف يمكنك أن تُحسِّن طريقتك.
- ٢ اكتب استنتاجًا منطقيًا يشرح كيف يؤثِّر «العامل الذي اخترته» على مُعدَّل سرعة التفاعُل. ولماذا؟





الشكل ٥-٩ الأدوات والأجهزة اللازمة للتجربة F

مصطلحات علمية

العامل الحفّاز Catalyst: مادة تزيد مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي دون أن تتغيَّر كيميائيًّا في نهاية التفاعُل ولا تستهلك خلال هذا التفاعُل.

تعمل العديد من العوامل الحفّازة عن طريق توفير مساحة سطحية يمكن أن تتفاعل عليها جُزيئات أو ذرّات أخرى. كما تعمل عوامل حفّازة أخرى بطرائق أكثر تعقيدًا. ولهذا السبب من الخطأ القول إن العوامل الحفّازة لا تُشارك في التفاعُل الكيميائي؛ فبعضها يشارك بالفعل في مرحلة من مراحل التفاعُل الكيميائي، ثم يعود إلى تركيبه السابق، لذلك تبقى كتلته ثابتة في نهاية التفاعُل. لأن العامل الحفَّاز لا يتغيّر كيميائيًّا.

أن تعطى تعريفًا كاملًا للعامل الحفّاز حيث تتضمَّن إجابتك أن العامل الحفّاز بحد ذاته لم يتعرّض لأي تغيُّر كيميائي في نهاية التفاعُل.

نظرية التصادم

تحدث التفاعُلات الكيميائية عندما تصطدم جُسَيمات المواد المتفاعلة بعضها ببعض، وفي التفاعلات التي تتضمَّن مواد صلبة تكون للمساحة السطحية للمادة المتفاعلة أهمية كبرى. فإذا تم تكسير المادة الصلبة إلى أجزاء أصغر سيتوفر المزيد من السطح المعرّض للتفاعُل. وهذا يعنى توفر المزيد من المواقع التي تحدث عليها التصادمات والتي تتيح بالتالي حدوث المزيد من التفاعُلات. إنّ حدوث تصادم بين جُسيمَين، لا يعنى بالضرورة حدوث تفاعُل. لكن من البديهي أنَّه، كلما ازداد عدد التصادمات بين الجُسيمات في مُدَّة زمنية معيَّنة ازداد احتمال حدوث تفاعُل ونتجت بالتالي زيادة في مُعدَّل سرعة التفاعُل.

- يجب أن تتصادم جُسيمات المواد المُتفاعلة (ذرّات، جُزيئات، أيونات) لكي يحدث تفاعُل كيمياًئي.
- لا يؤدّى كل تصادم بين الجُسيمات إلى حدوث تفاعُل كيميائي. فهناك تصادمات فعّالة تؤدّى إلى حدوث تفاعُل، وهناك تصادمات أخرى غير فعّالة لا تؤدّى إلى حدوث تفاعُل.


تشرح النقاط السابقة ما يسمّى بـ نظرية التصادُم Collision theory والتي يمكنّ تطبيقها في حالات أخرى. فعندما يكون تركيز المحلول أكبر فهذا يعنى وجود المزيد من جُسيمات المادة المُتفاعلة في حجم معيَّن فتصبح التصادمات أكثر تكرارًا، الأمر الذي يتيح في الغالب فرصة أكبر لحدوث تصادمات فعّالة، وبالتالي يؤدّى إلى حدوث التفاعُل الكيميائي. وهذا يعني أن مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي يصبح أكبر عندما يزداد تركيز المواد المُتفاعلة. يوضح الشكل (٥-١٠) التفاعُل الذي يحدث بين الخارصين وحمض الهيدروكلوريك وكيف يؤثر تكرار عملية التصادم على تغيير معدّل سرعة التفاعل.

عندما يتم تكسير المواد المُتفاعلة الصلبة إلى قطع أصغر أو تحويلها إلى مسحوق، فإن مُعدّل سرعة التفاعُل يكون أكبر مع زيادة مساحة السطح. ومساحة السطح الأكبر تعنى وجود المزيد من جُسيمات المواد المُتفاعلة المُعرّضة للتفاعُل على السطح، وبالتالي حدوث التصادمات بوتيرة أكبر، ما يؤدّى إلى ازدياد فرص حدوث التفاعُل. وهذا يعنى أن مُعدّل سرعة التفاعُل سيزداد (الشكل ١٠-٥ (A)). وعندما يكون تركيز المحلول أكبر يكون مُعدَّل سرعة التفاعُل أكبر. فالمحلول الأكثر تركيزًا يحتوي على المزيد من جُسَيمات المادة المُتفاعلة في حجم مُحدَّد. ولذلك سوف تكون وتيرة التصادمات أكبر في الغالب. ومع حدوث المزيد من التصادمات تزداد أمام الجُسيمات فرص التفاعُل. وهذا يعنى أن مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي سوف يكون أكبر عندما يزداد تركيز المواد المُتفاعُلة (الشكل ٥-١٠ (B)). وكذلك عندما ترتفع درجة الحرارة يحدث التفاعُل بمُعدَّل سرعة أكبر. ذلك أنّ الجُسيمات

عند درجات الحرارة المُرتفعة تتحرَّك بمُعدَّل أسرع. وهذا يعني أن التصادمات سوف تحدث بشكل أكثر تكرارًا الأمر الذي يتيح فرصة أكبر لحدوث تصادمات فعّالة وبالتالي يؤدي إلى حدوث التفاعُل (الشكل ٥-١٠ (C)). أضف إلى ذلك أن الجُسيمات ستمتلك المزيد من الطاقة عند درجات الحرارة المُرتفعة، ما يزيد فرص حدوث تصادُم ينتج عنه تفكيك للروابط الموجودة في جُسَيمات المواد المُتفاعِلة، وتشكّل روابط جديدة بما يؤدى لتكوّن النواتج.

تذكّر

عندما تشرح تأثيرات مساحة السطح والتركيز، باستخدام نظرية التصادم، تذكَّر أن المُهمّ هو وتيرة التصادم - لا تتحدث عن "تصادم أكثر" ولكن عن "ازدياد وتيرة التصادم". أما بخصوص تأثير درجة الحرارة، فسوف يكون من المهم أيضًا الإشارة إلى "ازدياد الطاقة"، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة التصادم.



الشكل ٥-١٠ استخدام نظرية التصادم لنفسِّر كيف تؤثّر العوامل المتنوِّعة في معدل سرعة التفاعُل الذي يحدث بين الخارصين وحمض الهيدرو كلوريك

طاقة التنشيط


لن يؤدّي كل تصادم بين الجُسَيمات في المخلوط المُتفاعل إلى حُدوث تفاعُل. من الضروري أن نعلم أننا نحتاج إلى كمّية مُحدَّدة من الطاقة للبدء بتفكيك الروابط. ويُعرف هذا الحد الأدنى من الطاقة باسم طاقة تنشيط Activation التفاعُل.

عندما تتصادم الجُسيمات، يجب أن تمتلك طاقة أكبر من طاقة التشيط، وإلا فإنها لن تتفاعل. وتمتلك التفاعُلات المختلفة طاقات تنشيط مختلفة، لأن الروابط التي سيتم كسرها في المواد المُتفاعِلة تمتلك قوى وطاقات مختلفة. ويمكن للتفاعُل الكيميائي أن يحدث فقط عندما تتصادم الجُسيمات المُتفاعِلة فيما بينها، مع طاقة كافية لتكسير روابطها.

لا تؤدّي زيادة مساحة السطح أو تركيز المواد المُتفاعِلة إلى زيادة كمّية الطاقة التي تمتلكها الجسيمات، بل تؤدّي فقط لزيادة وتيرة تصادمها. إلا أن رفع درجة حرارة التفاعُل سيؤدّي لزيادة عدد الجُسيمات التي تمتلك طاقة أكبر من طاقة التشيط من جهة، ولزيادة وتيرة التصادم بين هذه الجُسيمات من جهة أخرى.

أما العامل الحفّاز، فإن دوره هو تقليل كمّية الطاقة اللازمة لتفكيك الروابط. وهذا بدوره يقلّل من طاقة تنشيط التفاعُل ما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الفعّالة التي تزيد احتمال تكوّن المواد الناتجة. لذلك يصبح مُعدَّل سرعة التفاعُل أكبر.

ولتوضيح كيفية عمل العامل الحفّاز، لنفترض أننا نتنزّه سيرًا على الأقدام في الجبل الأخضر مثلًا، وهو أحد الجبال الشاهقة في السلطنة، والذي يبلغ ارتفاعه 2980 م. وسوف نبدأ من إحدى جهتي الجبل وهدفنا الوصول إلى الجهة الأخرى منه. يمكننا الذهاب بشكل مباشر نحو قمّة الجبل. وهذا يتطلّب منا أن نكون نشيطين للغاية. ولكننا نفضّل إيجاد مسار بديل عبر هذه الجبال. وهذا المسار سوف يتطلب طاقة أقلّ من تسلّق القمة. ونحن في مقاربتنا لهذه المسألة نعتبر أن نقطة البداية هي المواد المُتفاعلة، وأن نقطة النهاية هي المواد الناتجة. ويكون المسار عبر قمّة الجبل مُشابهًا للمسار غير المحفّز (في غياب العامل الحفّاز) في حين أن المسار البديل والأسهل عبر الجبال يكون مُشابهًا للمسار المُحفّز (في وجود العامل الحفّاز).



الشكل ١١٠٥ قد يكون الحاجز بين المواد المُتفاعِلة والمواد الناتجة مرتفعًا إلى درجة لا تستطيع معها تلك المواد تجاوزَه باستثناء المواد الأكثر نشاطًا (الأكثر طاقة). وبوجود العامل الحفاز تستطيع المواد تجاوزه حتى تلك الأقل نشاطًا

أسئلة

- ٥-٦ ما هو العامل الحفّاز؟
- ٧-٥ هل يؤدّي وجود العامل الحفّاز إلى زيادة طاقة تنشيط التفاعُل أم إلى تقليلها؟
 - ۵-۸ في ضوء نظرية التصادم لماذا يصبح مُعدَّل سرعة التفاعُل أكبر عند إجراء التغييرات الآتية:
 - أ. ارتفاع درجة الحرارة.
 - ب. زيادة مساحة السطح للمادة المُتفاعِلة الصلبة.
 - ج. زيادة تركيز محلول مادة مُتفاعلة.

٥-٣ تغيَّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية

تُطلق بعض التفاعُلات الكيميائية كمّيات هائلة من الطاقة. من المعروف مثلاً أنّ الحرائق غير المُنضبطة في حقول النفط في الصحاري تُطلق حرارة كافية لتحويل الرمل المحيط إلى زجاج. وتنتج حرائق الغابات، مثل حرائق غابات الأمازون المطيرة أو حرائق أستراليا التي شبّت خلال العام 2019، موجات هائلة من الحرارة (الصورة خلال العام الحرائق أضرارًا جسيمة بالحياة البرية، ويتطلّب إطفاؤها جهودًا وشجاعة كبيرة.



الصورة ٥٥٥ حريق في غابة


عندما يحترق الماغنيسيوم في الأكسجين (الصورة ٥-٦)، يتكون رماد أبيض كمادَّة جديدة، هي أكسيد الماغنيسيوم. يُنتج احتراق الماغنيسيوم لهبًا أبيض لامعًا، وتتحرَّر الطاقة

على شكل حرارة وضوء. ويكون هذا التفاعُل الكيميائي طاردًا للحرارة Exothermic reaction. ويُذكر أن عملية دمج عُنصرَي الماغنيسيوم والأكسجين معًا لتشكيل المُركَّب الجديد، عملية يصعب عكسها (يصعب تفكيك المُركَّب وإعادته إلى مواده الأوَّلية).




الصورة ٥-٦ يحترق الماغنيسيوم بقوة في الأكسجين

بعض التفاعُلات الكيميائية الأخرى مثل تلك الموجودة في "الأساور المتوهجة" الفلورسنتية، (الصورة ٥-٧) تنتج ضوءًا. حيث يتم إطلاق الطاقة على شكل ضوء. تُسمّى هذه العملية التضوّء الكيميائي Chemiluminescence.



الصورة ٥-٧ الأساور التي تتوهَّج في الظلام. الأساور المُتوهِّجة أنابيب بلاستيكية شفّافة تُستخدَم لمرَّة واحدة فقط، وهي تحتوي على مواد كيميائية مفصولة بعضها عن بعض بواسطة حاجز زجاجي. عندما يتم الضغط على الأنبوبة، ينكسر الحاجز الزجاجي، فيؤدّي اختلاط المواد إلى حدوث تفاعُل كيميائي ينتج عنه تضّوء كيميائي

ونحن نستخدم تفاعُلات مماثلة يمكن التحكُّم بها، لتوفير الحرارة للمنازل وللصناعة. إُذ يتم حرق الغاز الطبيعي، الذي يتكوَّن بشكل رئيسي من غاز الميثان، في ظروف يتم التحكُّم بها، لإنتاج الحرارة المُستخدَمة للطهي في أغلب المنازل (الصورة ٥-٨).



الصورة ٥-٨ حلقة غاز مُضيئة على موقد


تضاعُل الميثان والأكسجين

تحتوي جُزيئات الهيدروكربونات على عُنصرَي الكربون والهيدروجين فقط. ويُعد الميثان أبسط الهيدروكربونات. وعندما يحترق الميثان بوجود الأكسجين (الشكل ٥-١٢) يُنتج هذا التفاعُل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، كما في المعادلة الآتية:

الماء + ثاني أكسيد الكربون
$$\leftarrow$$
 الأكسجين + الميثان
$${\rm CH_4(g)} + 2O_2(g) \rightarrow {\rm CO_2(g)} + 2{\rm H_2O(g)}$$

تذكّر

من المفيد أن نتذكّر أن تفاعُلات الاحتراق تكون دائمًا طاردة للحرارة. أنّ التفاعُلات الطاردة للحرارة أكثر شيوعًا من التفاعُلات الماصَّة للحرارة.



سير التفاعُل

الشكل ٥-١٢ احتراق الميثان مع الأكسجين. يبدأ أولاً بتكسير الروابط في المواد المُتفاعِلة، يليه تكوُّن الروابط الجديدة في النواتج

ويُعد احتراق الميثان تفاعُلاً طاردًا للحرارة، حيث يطلق الحرارة، مما يؤدّي إلى ارتفاع درجة حرارة محيط مخلوط التفاعُل.

تضاعل النيتروجين والأكسجين

تعدّ التفاعُلات الماصّة للحرارة أقلّ شيوعًا بكثير من التفاعُلات الطاردة للحرارة. وفي هذه الحالة، يتمّ امتصاص طاقة حرارية من مُحيط مخلوط التفاعُل، ممّا يؤدّي إلى خفض درجة حرارة هذا المحيط. إن التفاعُل بين النيتروجين والأكسجين الذي يُنتج أحادي أكسيد النيتروجين، هو تفاعُل يتمّ خلاله امتصاص الطاقة الحرارية من مُحيط المخلوط. ويكون هذا التفاعُل الكيميائي ماصّا للحرارة Endothermic reaction.

والتفاعُل بين النيتروجين والأكسجين هو أحد التفاعُلات التي تحدث في مُحرِّك السيّارة عند درجات الحرارة العالية ومُعادَلة هذا التفاعُل هي الآتية:

أحادي أكسيد النيتروجين \rightarrow الأكسجين + النيتروجين $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$

مصطلحات علمية

التفاعل الطارد للحرارة Exothermic reaction: هو التفاعُل الذي يطلق الحرارة الناتجة منه نحو محيطه الخارجي.

التفاعل الماص للحرارة Endothermic reaction: هو التفاعُل الذي يمتص الحرارة التي يحتاجها من محيطه الخارجي.

نشاط ٥-٤

التفاعُلات الطاردة والماصّة للحرارة

المهارات:

- يبين بطريقة عملية المعرفة المُتعلِّقة بكيفية
 الاستخدام الآمن للتقنيات والأجهزة والمواد (بما فيها اتباع سلسلة من التعليمات المُناسبة).
 - ينجز التجربة ويُسجِّل الملاحظات والقياسات والتقديرات.
 - يفسر الملاحظات التجريبية والبيانات ويُقيِّمها.

ينتج دائمًا تغيُّر في الطاقة الإجمالية عند حدوث أي تفاعُل كيميائي. يهدف هذا النشاط إلى استقصاء ما إن كان يحدث امتصاص للحرارة (تفاعُل ماصّ للحرارة) أو إطلاق للحرارة (تفاعُل طارد للحرارة) خلال ثلاثة تفاعُلات كيميائية مختلفة.

ضع النظّارة الواقية (لحماية عينيك).

الطريقة

- ١ قم بإعداد جدول نتائج كالجدول المُقابل.
- ٢ ضع ML من الماء في كوب من البوليسترين. قس درجة حرارة الماء وسجِّل قيمتها في عمود "قبل" في جدول النتائج.
- أضف مقدار ثلاث ملاعق كيماويات من كبريتات
 النحاس (۱۱) اللامائية إلى الماء. حرّك بوساطة ميزان
 حرارة (ثرمومتر). استمرّ في ملاحظة درجة الحرارة.
- التغيَّر في عمود "بعد" في جدول النتائج درجة الحرارة التي وصلت إليها والمرتبطة بانتهاء التفاعُل. احسب التغيَّر في درجة الحرارة ودوِّنه في عمود "التغيّر" في

- الجدول. دوّن أيضًا ملاحظاتك واستنتاجك حول ما إذا كانت التجربة طاردة للحرارة أو ماصة للحرارة.
- دع المحلول الناتج عن الخطوة ٤ ليبرد وقس درجة حرارته. ثم أضف مقدار ثلاث ملاعق كيماويات من مسحوق الخارصين إلى هذا المحلول. ثم حرِّك المخلوط. سجِّل درجة الحرارة ودوِّن ملاحظاتك في الجدول (التجربة 2).
- أفرغ كوب البوليسترين واغسله وضع فيه 50 mL أفرغ كوب البوليسترين واغسله وضع فيه 50 mL الماء. وقس درجة حرارته، ثم أضف ثلاث ملاعق كيماويات من نيترات الأمونيوم الصلب (NH_4NO_3). سجِّل درجة الحرارة مع ملاحظاتك في الجدول (التجرية 3).

جدول النتائج

طارد للحرارة		(°C)			
أو ماصّ للحرارة	المُلاحظات	التغيُّر	بعد	قبل	التجربة
					1
					2
					3

الأسئلة

- أي من هذه التفاعُلات طارد للحرارة وأيّ منها ماصّ للحرارة؟
 - ۲ لماذا يُستخدَم كوب من البوليسترين لتنفيذ هذه التجارب؟
- کیف سیتأثر التغیُّر فی درجات الحرارة إذا قلَّانا كمِّیة الماء المستخدم إلى النصف من (mL) إلى (25 mL)

أسئلة

- ٥-٩ صنف التغيُّرات الآتية إلى ماصّة أو طاردة للحرارة:
 - أ. تكثيف البخار الى ماء.
 - ب. احتراق الماغنيسيوم.
 - ج. إضافة حمض الكبريتيك المُركّز إلى الماء.
 - د. تبخّر السائل المُتطايِر.

ملخّص

ما يجب أن تعرفه:

- تحدث التفاعُلات الكيميائية المختلفة عند مُعدَّلات سرعة مختلفة إلى حدّ بعيد، ويمكن تغيير مُعدَّل سرعة تفاعُل معيّن عن طريق تغيير الظروف، بما فيها درجة الحرارة.
- تتم زيادة مُعدَّل سرعة بعض التفاعُلات باستخدام العامل الحفّان.
 - طاقة تنشيط التفاعُل هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء هذا التفاعُل.
- التغيُّرات التي تزيد من تكرار عملية التصادم بين جُسَيمات المواد المُتفاعلة تؤدّي إلى زيادة مُعدَّل سرعة التفاعُل.
- تتضمَّن جميع التفاعُلات الكيميائية على تغيُّرات في الطاقة، وتطلق معظم التفاعُلات الكيميائية طاقة حرارية نحو محيطها (تفاعُلات طاردة للحرارة).
 - تمتص بعض التفاعُلات الكيميائية الطاقة الحرارية فتكون ماصّة للحرارة.

أسئلة نهاية الوحدة

١ زاوج بين كلِّ من المصطلحات المُدرجة في العمود الأيمن والتعريف الخاصِّ به في العمود الأيسر:

مُعدَّل سرعة التفاعُل العامل الحفّاز تفاعُل ماصّ الحرارة تفاعُل طارد للحرارة

مادة تزيد مُعدّل سرعة التفاعُل الكيميائي من دون أن يتمّ استهلاكها.

تفاعُل كيميائي يمتصّ الحرارة من محيطه.


تفاعُل كيميائي يطلق الحرارة نحو محيطه.

السرعة التي يحدث عندها التفاعُل الكيميائي.


أكمل الجمل الآتية المتعلِّقة بمُتابعة معدَّل سرعة التفاعُل مُستخدِمًا كلمات من القائمة أدناه:

مادة مُتفاعِلة	مادة ناتجة	قياس	المحلول
	راسب	الميزان	اجمع
مُعدَّل استهلاك أو لتفاعُل وهي: ثم قس كتلة مخلوط التفاعُل مع	طرائق لمتابعة مُعدَّل سرعة ال		تكوِّن
وقس حجمه. ائي حدِّد الزمن المُستغرَق والذي لا يمكنك بعده	ز الناتج عن التفاعُل الكيميائي عن تفاعُل كيميا 	الغار ة ×: عندما ينتج لاللال	• اختفاء علامة

س يبيِّن الشكل أدناه الأدوات اللازمة لمُتابعة مُعدَّل سرعة التفاعُل بين قطع الرخام (كربونات الكالسيوم) وحمض الهيدروكلوريك، وينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون ومحلول كلوريد الكالسيوم والماء. يتم تكرار التجربة مرة أخرى باستخدام مسحوق الرخام بدلاً من قطع الرخام.



- أ. اكتب المعادلة اللفظية لهذا التفاعُل.
- ب. حدِّد المُتغيّر المستقل الموجود في هذه التجربة.
- ج. استنتج وحدة فياس المُتغيِّر التابع الموجود في هذه التجربة.
 - د. صف كيف ستتغيَّر الكتلة خلال تنفيذ هذه التجربة.
- استخدم نظریة التصادُم لتفسیر تأثیر استخدام مسحوق الرخام عوضًا عن قطع الرخام.
- كُ يُظهِر الشكل أدناه تمثيلًا بيانيًا لحجم الغاز الذي تم جمعه عندما تفاعُل شريط من الماغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك.



- أ. سمِّ جهازًا واحدًا يمكن استخدامه لقياس حجم الغاز الناتج.
 - ب. اقترح عنوانًا للمحور السيني.
- ج. استخدم نظرية التصادُم لكي تفسِّر لماذا يمتلك المنحنى C مَيلًا صاعدًا أكثر حدّة من الذي يمتلكه المنحنى D.
 - د. فسر: كلا التفاعُلين يتّجهان نحو نقطة النهاية نفسها.

• يبين الشكل أدناه الأدوات المستخدمة لدراسة مُعدّل سرعة التفاعُل بين ثيوكبريتات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك.




الذي تمثله المعادلة اللفظية الآتية:


الماء + ثنائي أكسيد الكبريت + الكبريت + كلوريد الصوديوم → حمض الهيدروكلوريك + ثيوكبريتات الصوديوم نفّذ طالب التجربة حول مُعدّل سرعة التفاعُل عند درجة حرارة 20°C.

كرَّر الطالب التجربة مرَّة أخرى ولكن هذه المرة باستخدام محاليل تم تبريدها إلى درجة حرارة C 10°C.

- أ. مُستعينًا بمعادلة التفاعُل، صف كيف يستطيع الطالب مُتابعة مُعدَّل سرعة هذا التفاعُل باستخدام هذه الأدوات. (علمًا بأنه لا يحدث أي نقص في الكتل ولا يتغير حجم مخلوط التفاعل أثناء التجربة)
 - ب. توقع الطالب أن التفاعُل الذي يحدث عند درجة حرارة °C سيستغرق مدة زمنية أطول من ذلك الذي يحدث عند درجة حرارة °C . فسِّر ما إذا كان هذا التوقع صحيعًا أم لا.
 - ج. استخدم نظرية التصادم لتفسير الفرق في مُعدَّل سرعة التفاعُل، بين التفاعُل الذي يحدث عند درجة حرارة C °C. والتفاعُل الذي يحدث عند درجة حرارة C °C.
 - د. ضع خطّة توضح كيفية استخدام هذه التجربة لتظهر أن مضاعفة تركيز حمض الهيدروكلوريك تنتج عنه مضاعفة مُعدّل سرعة التفاعُل أيضًا.
 - بينّ الشكل أدناه الأدوات والأجهزة اللازمة لمراقبة تفكُّك فوق أكسيد الهيدروجين (H2O2) لتكوين الماء وغاز الأكسجين بوجود أكسيد المنغنيز (IV).



- أ. سمّ الجهاز المُستخدَم لجمع الغاز وقياس حجمه.
 - ب. ما دور أكسيد المنغنيز (١٧) في هذا التفاعُل؟
- ج. اقترح كيف يمكن للتجربة أن تثبت أن مادة أكسيد المنغنيز (١٧) لم تُستهلَك في هذا التفاعُل.
 - ٧ يُبيّن الشكل أدناه تمثيلاً بيانيًّا لكمّية المادة الناتجة المُتكوِّنة في تفاعُل ما.



- أ. فسِّر: يمرّ المنحنى عبر نقطة الأصل للتمثيل البياني.
 - ب. صف النمط العام الموجود في التمثيل البياني.
- ج. فسِّر: يتغيّر مُعدَّل سرعة التفاعُل بمرور الزمن في تفاعُل معيّن.
 - د. حدّد من المنحنى الحرف الذي يدلّ على اكتمال التفاعُل.
- **ه.** ارسم على التمثيل البياني نفسه منحنى التفاعُل نفسه ولكن عند درجة حرارة أدنى.
- ♦ قام أحد الطلاب باستقصاء تغيُّر الطاقة في أربع عمليات كيميائية مختلفة.
 في كل تجربة، أُضيف مقدار ثلاث ملاعق كيماويات من مسحوق صلب إلى 10 mL من الماء.
 وسُجِئت درجات الحرارة في بداية ونهاية كل تجربة في جدول النتائج المُبيَّن أدناه.

	درجة الحرارة (°C)							
التغيُّر في درجة الحرارة	فيالنهاية	في البداية						
	14	22	1					
	33	23	2					
	12	20	3					
	32	21	4					

- أ. حدِّد الأدوات التي سيستخدمها الطالب لإجراء هذه التجارب.
- ب. أكمل جدول نتائج الطالب من خلال احتساب تغيّر درجة الحرارة لكل تجربة.
 - ج. حدِّد التجارب الماصة للحرارة موضِّحًا السبب.
 - د. فسِّر ماذا يحدث للطاقة الحرارية خلال التفاعُلات الماصَّة للحرارة.
 - استنتج أى تجربة هي الأكثر طردًا للحرارة موضعًا السبب.
- و. وضّع تغييرين يمكن إجراؤهما لزيادة مقدار التغيّر في درجة الحرارة في هذه التجارب.

مصطلحات علمية

الانتشار Diffusion: هو انتقال الموائع من منطقة ذات تركيز مُرتفع باتِّجاه منطقة ذات تركيز مُنخفض نتيجة لحركة جُسيماتها العشوائية، ممّا يؤدّي في النهاية إلى تجانس تركيز تلك الجُسَيمات في كامل المخلوط.

لا تحدث عملية الانتشار في المواد الصلبة. وتكون عملية الانتشار في المواد السائلة أبطأ بكثير مما هي عليه في الغازات. (ص ٢٤) الانصهار Melting: هو تغيُّر حالة المادّة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. (ص ١٦)

الأنيون Anion: الذرَّة التي اكتسبت إلكترونًا واحدًا أو أكثر (الأيون السالب). (ص ٦٩)

الأيون lon: جُسَيم فقد أو اكتسب إلكترونات. (ص ١٨)

التبخُّر Evaporation: هو تغيُّر حالة المادَّة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة أدنى من درجة الغليان. (ص ١٧) التبلُور Crystallisation: هو تشكُّل بلورات عند ترك محلول فوق المشبع ليبرد. (ص ٢٨)

التجمُّد Freezing: هو تغيُّر حالة المادّة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة الانصهار. (ص ١٦)

الترشيح Filtration: هو فصل المادة الصلبة عن السائل باستخدام ورق الترشيح. (ص ٢٧)

التركيب الإلكتروني Electron arrangement: هو تنظيم الإلكترونات في مستويات الطاقة المختلفة. (ص ٥٧)

التفاعُل الطارد للحرارة Exothermic reaction: هو التفاعُل الذي يطلق الحرارة الناتجة منه نحو محيطه الخارجي.

(ص ۹٦)

التفاعُل الماص للحرارة Endothermic reaction: هو التفاعُل الذي يمتص الحرارة التي يحتاجها من محيطه الخارجي.
(ص ٩٦)

التقطير Distillation: هو فصل سائل عن مخلوط بالاعتماد على الاختلاف في درجة الغليان. (ص ٢٩)

التقطير التجزيئي Fractional distillation: هو فصل مكوِّنات مخلوط من السوائل باستخدام الاختلاف في درجة الغليان. (ص ٢٩) التكافؤ Valency:

التكافؤ في الرابطة التساهُمية:

هو عدد الروابط الأحادية التي يمكن لذرّات عُنصر ما أن تُكوِّنها.

التكافؤ في الرابطة الأيونية:

هو عدد الإلكترونات التي تفقدها ذرّة الفلزّ فتصبح أيونًا موجبًا، (وهو يساوي قيمة الشحنة الموجبة لذلك الأيون) أو: هو عدد الإلكترونات التي تكسبها ذرَّة اللافلزّ فتصبح أيونًا سالبًا

هو عدد الإنصرونات التي تحسبها دره اللاقلر فتصبح ايونا سا (وهو يساوي قيمة الشحنة السالبة لذلك الأيون). (ص ٧٣)

التكثّف Condensation: هو تغيُّر حالة المادّة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. (ص ١٨)

الجدول الدوري Periodic table: هو الجدول الذي نُظِّمت فيه العناصر الكيميائية وفقًا لزيادة العدد الذرِّي والتركيب الإلكتروني. (ص ٥٣)

الحالة الفيزيائية Physical state: للمادّة ثلاث حالات، هي: الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية .(ص ١٥)

الدورة Period: صفّ في الجدول الدوري يحتوي على عناصر مُرتَّبة وفقًا لتزايُد أعدادها الذرّية. (ص ٥٣)

الرابطة الأيونية lonic bond: هي الرابطة التي تنشأ من التجاذب الكهروستاتيكي بين أيونات ذات شحنات مُتعاكسة (أنيونات وكاتيونات). ينتج عن هذه الرابطة مُركَّبات أيونية lonic (ص ٦٩)

الرابطة التساهُميَّة Covalent bond: هي الرابطة التي تنشأ من التشارُك في زوج واحد من الإلكترونات أو أكثر بين ذرَّتَين. ينتج عن هذه الرابطة مُركَبات تساهمية جُزيئيَّة Molecular covalent (ص ٦٩)

طاقة التنشيط Activation energy: الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن تمتلكها الجُزيئات المُتفاعِلة لحدوث التفاعُل. (ص ٩٤) العامل الحفّاز Catalyst: مادة تزيد مُعدَّل سرعة التفاعُل الكيميائي من دون أن تتغيَّر كيميائيًا في نهاية التفاعُل ولا تستهلك خلال هذا التفاعُل. (ص ٩٢)

العدد الذرّي Atomic number: هو عدد البروتونات في نواة ذرَّة العنصر. (ص ٤٤)

العدد الكُتَلي Mass number: هو العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات في نواة ذرَّة العنصر. (ص ٤٤)

الغليان Boiling: هو تغيُّر حالة المادّة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة غليان السائل. (ص ١٧)

الكاتيون Cation: هو الذرَّة التي فقدت إلكترونًا واحدًا أو أكثر

(الأيون الموجب). (ص ٦٩)

الكروماتوجرافيا (الاستشراب) (كروماتوجرافيا الورق)

Chromatography: تقنية تسمح بفصل مُكوِّنات مخلوط من مواد

مُذابة ملوّنة أو غير ملوّنة (باستخدام ورق ومذيب). (ص ٣٠)

المادّة Matter: أي شيء له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ. وللمادّة

ثلاث حالات فيزيائية هي: الصُّلبة والسائلة والغازية. (ص ١٦)

المجموعة Group: عمود في الجدول الدوري يحتوي على عناصر

لها خصائص كيميائية مُتماثلة. (ص ٥٣)

المحلول Solution: مخلوط من مادتين، هما:

المُذاب Solute: المادّة التي تذوب.

المُذيب Solvent: السائل الذي تذوب فيه المادّة المُذابة.

(ص ۲۳)

مُعدَّل سرعة التضاعُل Rate of reaction: هو سرعة تكوُّن نواتج

التفاعُل الكيميائي (أو سرعة استهلاك المواد المُتفاعلة).

(ص ۸۲)

هناك نوعان من المواد النقية Pure substances، وهما العناصر، والمُركَّبات:

العُنصر Element: مادّة لا يمكن تجزئتها كيميائيًّا إلى مواد

أبسط منها.

الْمُركَّب Compound: مادّة مُكوّنة من عُنصرين، أو عدَّة

عناصر، مُترابِطة كيميائيًّا. (ص ٤٠)

النظائر Isotopes: ذرّات للعنصر نفسه، تملك العدد الذرّي نفسه،

لكنّها تختلف في العدد الكُتَلي. (ص ٤٦)

الجدول الدوري للعناصر

				المجموعة ا	المجموعة ١٧	المجموعة ٧	المجموعة الا	المجموعة االا	2 He Helium Pagaga
				5 B Boron بورورن 11	6 Carbon کربون 12	7 N Nitrogen نيتروجين 14	8 Oxygen أكسجين 16	9 F Fluorine فلور 19	10 Ne Neon نیون 20
			·	13 Al Aluminium ألومينيوم 27	14 Si Silicon سیلیکون 28	15 P Phosphorus فوسفور 31	16 S Sulfur کبریت 32	17 C کاور کلور 35.5	18 Ar Argon أرغون 40
27 Co Cobalt کوبالت 59	28 Ni Nickel نیکل 59	29 Cu Copper نحاس 64	30 Zn Zinc خارصين 65	31 Ga Gallium خاليوم 70	32 Ge Germanium جیرمانیوم 73	33 As Arsenic خرزنیخ 75	34 Se Selenium سیلینیوم 79	35 Br Bromine بروم 80	36 Kr Krypton کریبتون 84
45 Rh Rhodium رو د يوم 103	46 Pd Palladium بالاديوم 106	47 Ag Silver فضة 108	48 Cd Cadmium کادمیوم 112	49 In اndium اندیوم 115	50 Sn Tin قصدیر 119	51 Sb Antimony أنتيمون 122	52 Te Tellurium تيلوريوم 128	53 lodine يو د 127	54 Xe Xenon زينون 131
77 الا Iridium اریدیوم 192	78 Pt Platinum بلاتین 195	79 Au Gold ذهب 197	80 Hg Mercury زئبق 201	81 T Thallium ثاليوم 204	82 Pb Lead رصاص 207	83 Bi Bismuth بيزموث 209	84 Po Polonium بولونيوم –	85 At Astatine أستاتين –	86 Rn Radon رادون –

63	64	65	66	67	68	69	70	71
Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutetium
أوروبيوم	غادولینیوم	تيربيوم	دیسبروسیوم	هوليميوم	إيربيوم	ثوليوم	إيتربيوم	لوتيشيوم
152	157	159	163	165	167	169	173	175
95 Am Americium أميرسيوم	96 Cm Curium کوریوم	97 Bk Berkelium بیرکیلیوم	98 Cf Californium کالیفورنیوم	99 Es Einsteinium أنشتاينيوم -	100 Fm Fermium فیرمیوم	101 Md Mendelevium ماندیلیفیوم –	102 No Nobelium نوبيليوم —	103 Lr Lawrencium لاورنسيوم

الدورة 1	المجموعة ا	المجموعة اا	ناح (إسم	1 H Hydrogen هيدروجين 1				
الدورة 2	3 Li Lithium ليثيوم 7	4 Be Beryllium بریلیوم 9						
الدورة 3	11 Na Sodium صوديوم 23	12 Mg Magnesium ماغنیسیوم 24						
الدورة 4	19 K Potassium بوتاسيوم 39	20 Ca Calcium کالسیوم 40	21 SC Scandium سکاندیوم 45	22 Ti Titanium تیتانیوم 48	23 V Vanadium فنادیو م 51	24 Cr Chromium کروم 52	25 Mn Manganese منغنیز 55	26 Fe اron عدید 56
الدورة 5	37 Rb Rubidium روبيديوم 86	38 Sr Strontium سترونشيوم 88	39 Y Yttrium إيتريوم 89	40 Zr Zirconium زیرکونیوم 91	41 Nb Niobium نيوبيوم 93	42 Mo Molybdenum موليبدنيوم 96	43 Tc Technetium تکنیشیوم -	44 Ru Ruthenium روثینیوم 101
الدورة 6	55 Cs Caesium سيزيوم 133	56 Ba Barium باريوم 137	La to Lu	72 Hf Hafnium هافنيوم 178	73 Ta Tantalum تانتالوم 181	74 W Tungsten تنغستن 184	75 Re Rhenium رينيوم 186	76 Os Osmium أوزميوم 190
الدورة 7	87 Fr Francium فرانسيوم –	88 Ra Radium راديوم –	Ac to Lr					

57 La Lanthanum لانثانوم 139	58 Ce Cerium سريوم 140	59 Pr Praseodymium برازیودیمیوم 141	60 Nd Neodymium نیو دیمیوم 144	61 Pm Promethium برومیثیوم	62 Sm Samarium ساماريوم 150
89 Ac Actinium أكتينيوم –	90 Th Thorium ثوريوم -	91 Pa Protactinium بروتاکتینیوم –	92 U Uranium يورانيوم -	93 Np Neptunium نبتونيوم	94 Pu Plutonium بلوتونيوم -

شكروتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم فى الإعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر تم استخدامه لإنجاز هذا العمل، إلا أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا. وفي حال إغفالهم لأي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

HRAUN/GI; CHARLES D. WINTERS/SPL; ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY/SPL (x2); V. Belov/Shutterstock; ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY/SPL (x2); GRAHAM J. HILLS/SPL; Srg Gushchin/Shutterstock; Richard Harwood; Jeffrey Hamilton/GI; Kerrick/GI; CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/GI; Turnervisual/GI; Kerstin Waurick/GI; boscorelli/Shutterstock; CHARLES D. WINTERS/SPL; MARTYN F. CHILLMAID/SPL and Oman Ministry of Education; SCOTT CAMAZINE/K. VISSCHER/SPL; MARTYN F. CHILLMAID/SPL; Leslie Garland Picture Library; TEK IMAGE/SPL

SPL = Science Photo Library, GI = Getty Images





الكيمياء

كتاب الطالب

يزخر كتاب الطالب بالعديد من الموضوعات مع شرح واضح وسهل لكل المفاهيم المتضمنة في هذه الموضوعات، ويقدِّم أنشطة ممتعة لاختبار مدى فهم الطلاب.

يتضمن كتاب الطالب:

- أنشطة عملية في كل وحدة، لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية.
 - أسئلة عن كل موضوع لتعزيز الفهم.
- مصطلحات علمية رئيسية موضَّحة في الوحدات، فضلاً عن
 قاموس للمصطلحات يرد في آخر الكتاب.
- أسئلة في نهاية كل وحدة من شأنها تأهيل الطلاب لخوض الاختبارات.

إجابات الأسئلة مُتضمَّنة في دليل المعلّم.

يشمل منهج الكيمياء للصف التاسع من هذه السلسلة أيضًا:

- كتاب النشاط
- دليل المُعلِّم